

1.

LC03: Stratégies en synthèse Organique.

Niveau: Terminale

Prérequis: * Transformations en chimie Organique

→ Grandes catégories, groupes caractéristiques

* Cinétique et catalyse

* Notion d'équilibre chimique

* Réactions d'esterification

* Principes de la spectroscopie IR et RMN

Introduction: En chimie organique, la variété des molécules synthétiques est considérable!

Nous allons nous mettre dans la peau du chimiste Organicien désireux d'effectuer une synthèse et regarder les angles d'attaques à adopter.

Le fil rouge: Synthèse de l'aspirine. Un des


les plus consommés $\approx 40\ 000\ t/\text{an}$.

Médicaments

Antalgique


Anti-Saule
-Pyrétique

Hemisynthèse
PIRIA
1838



Acide salicylique

HOFFMAN
1897



Acide Acétylsalicylique

1 saule = 20 m² \leftrightarrow 3 kg / an

$\rightarrow \frac{4 \times 10^7}{3} \times 20 \approx 30\ 000\ \text{ha}$

de Saules = 3 fois Paris.


KOLBE
1860
phénol.

Stratégie de Commercialisation.
[1]

Hoffman propose son esterification, comment la rendre efficace en vue d'une commercialisation ?


I. Optimiser le choix de ses paramètres expérimentaux.

I.4. Choix d'un réactif performant [2]




anhydride éthanoïque. $\approx 45 \text{ €/L}$

2 avantages : (i) grande réactivité
(acide éthanoïque)




$$K^\circ = 80.$$

(ii) assèche le milieu réactionnel
→ hydrolyse de l'ester impossible
stratégie la réaction est totale.



hydrolyse de l'ester, en milieu basique
= SAPONIFICATION.



I.2. Déplacement d'équilibre [2]

La température, la pression, la solubilisation des réactifs permettent de déplacer l'équilibre.

Mais aussi l'ajout d'un excès de réactif ou encore le retrait d'un réactif (ici H_2O !)

Loi de Le Chatelier $A = -\frac{\partial G}{\partial \xi} = RT \ln \frac{K(T)}{Q_R(\xi)}$

Relation de Van't Hoff $\frac{d}{dT} (\ln K_p^\circ) = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}$ (pour les questions)

I.3. Optimisation de la cinétique [2]


Trouver un compromis avec la durée de réaction

Effets de T° , Concentrations, solvants, Catalyseur HSO_4^-

Le pH permet de jouer sur la solubilité des réactifs, empêcher des réactions parasites.

I.4. Comparaison de 2 protocoles [2]

Avec le chlorure d'éthanoyle CH_3COCl ← très réactif
On peut envisager la même synthèse.



Il faut adapter le protocole

avec l'eau




- solvant : dichlorométhane.
- température : maintenue à 0°C.
- verrerie sèche !
- circulation de gaz diazote pour éviter le contact avec l'air.

Pictogrammes :

- provoque des brûlures
- liaisons oculaires graves
- très inflammable.

Coût : 49€ les 2,5 mL

Pour ces raisons, on préfèrera :



Une synthèse organique c'est aussi adapter des 5 techniques de laboratoire pour l'élaboration d'un protocole efficace.

II. Un panel des techniques expérimentales au service de la synthèse organique . [2]

II. 1. Dispositifs de chauffage

* Chaudrage à reflux Stratégie: éviter les pertes de matière en reconduisant les vapeurs.

* Bain eau-glacée ex avec LiCl réactions. ↳ exothermiques, sécurité.

* DEAN-STARK. principe: le solvant (cyclohex. Toluène...) entraîne l'eau lors du chauffage.

Lorsque le liquide se condense dans le DEAN STARK il se sépare en 2 phases: l'eau plus dense au fond et le solvant retourne dans le ballon.

Stratégie: déplacer l'équilibre en éliminant l'eau.

Condition: eau plus dense que le solvant.


II.2. Techniques d'extraction

- * Cristallisation principe: extraire une espèce solide dissoute.

Il faut jouer sur la température, le pH pour diminuer la solubilité de l'espèce et la faire précipiter.

Puis essorage sur filtre Büchner

Aspect: Cristaux
Amorphes
désorganisés




- * Extraction liquide-liquide

principe: Extraire une espèce chimique à l'aide d'un solvant extracteur.

Il faut trouver un solvant qui solubilise bien l'espèce à extraire et non miscible avec le mélange.

Ampoule à décanter



II.3. Techniques de purification

- * Distillation

principe: jouer sur la différence de T_{eb} especes chimiques / solvant.

* Recristallisation

7.

principe: on tire partie de la différence de solubilité à chaud et à froid.

Les impuretés en faible concentration, elles précipitent moins facilement que le produit à récupérer → on laisse refroidir.

Aspect Cristaux organisés, solide cristallin

Intérêt industriel / pharmaceutique → Polymorphisme
faculté de cristalliser en des structures différentes selon les conditions ambiantes.

Transition: Pour s'assurer que les stratégies mises en œuvre ont été payantes et dans un souci de contrôle qualité, le chimiste doit caractériser ses produits.

III. Caractérisation des produits

III. 1. Rendement d'une synthèse [2]

Répond à une logique économique

$$\eta = \frac{m_{\text{produits}}}{m_{\text{réactifs}}} = \frac{m_{\text{produits}}}{M_{\text{produits}}} \times \frac{M_{\text{réactif}}}{M_{\text{réactif}}} = \frac{4,7}{180,2} \times \frac{128,1}{5}$$

rapport qté produits totale
acide salicylique

$$= 70\% \quad [1]$$

Sans montage à reflux $\rightarrow \eta \approx 5\% \Rightarrow$ Stratégie payante.

→ Pureté ?


III. 2. Caractérisation par les grandeurs physico-chimiques

* Températures de fusion au Banc Köfler


$T_{\text{fus. brut}} \approx 120^\circ\text{C} < T_{\text{fus. att.}} = 138^\circ\text{C}$ Aspirine. \leftarrow Les impuretés abaissent T_{fus}

$T_{\text{fus. recristallisé}} \approx 140^\circ\text{C} \leftarrow$ plus pure.

* Tests caractéristiques \rightarrow Avec du (FeCl_3) [1]



(1)
réactif (dans l'éthanol)




(2)
produit brut



(3)
produit purifié

* La Chromatographie sur couche mince

9.



Principe. Migration par capillarité sur une phase fixe (silice) du produit entraîné par une phase mobile : l'éluant.

- ① Aspirine pure du commerce.
- ② Aspirine purifiée par mes soins
- ③ Brut réactionnel
- ④ Réactif pur du commerce.
- ⑤ Aspirine + réactif du commerce

III. 3. Caractérisation par Spectroscopie

RMN protoms (transparents)
IR
UV ...

Conclusion :

messages importants :

- justification des 10.
* Choix des paramètres expéri.
* Choix des techniques,
montages, purification,
caractérisation.
* Coût
* Sécurité.
* Comparaison des avantages
et inconvénients de 2 protocoles.


Ouverture :

Nous venons au prochain chapitre la notion de sélectivité, qui est importante dans les stratégies de synthèse à mettre en œuvre.

Sélectionner un produit plutôt qu'un autre a une grande importance pour les laboratoires pharmaceutiques.

Scandale du (S)-Thalidomide

Molécules chirales
douées de pouvoir
rotatoire



difformité \leftarrow des foetus

Nausées
femmes
enceintes.

Enantiomères

BIBLIOGRAPHIE

- [1] R. Barbe, J.F. Maréchal. La chimie expérimentale - 2 chimie organique et minérale. DUNOD, 2007.
- [2] Physique-Chimie TS - NATHAN, 2012
 - HACHETTE, 2012
 - BELIN, 2012
- [3] P. Gréalias, Chimie PCSI 1^{ère} année, TEC & DOC.

- * Commentaires et questions aux pages suivantes
 La leçon était trop longue → il faut mettre les techniques expérimentales en prérequis et utiliser la synthèse de l'aspirine juste pour en illustrer quelques points (par exemple le filtrage en live).
- * D'autres manipulations sont proposées par la correctrice
 → BELIN p248 : synthèse de la diisopropylacétone.
- IDEE : faire des comparaisons → tableau comparatif de deux protocoles.

Queso.

1) qu'est-ce qu'il y a ds le cachet d'aspirine?

↳ principe actif

↳ excipient

2) A quoi sert un excipient?

↳ forme ...


3) Comment on appelle le domaine de la chimie qui met en forme

4) Qu'est-ce que les réactifs d'une estérification?

↳ Alcool + Acide

5) Quelles sont les caractéristiques? → reversible!

6) Ecrire le mécanisme



7) Quelles sont les autres manières d'envisager cette réact?

↳ R-OH , R'-COO^-

8) CCM ou dichloro scénario?

↳ gain - perte.

9) qu'est ce que vs pouvez dire sur la CCM?

donner les valeurs approximatives.

$r_f \approx 0,2 - 0,2$ C'est quoi r_f ?

10) de quelle solvant a été fil cette RMN? chloroforme de l'éther

11) on utilise quoi de solvant pr une RMN? TMDS

12) acide carbo → quelle type de bande sur un spectre IR? bande caractéristique? $\approx 3400 \text{ cm}^{-1}$

13) grande synthèse d'un produit anticancéreux.

↳ Taxol. réussit pour un cas de Gif ...

↳ chimiste Polon

douture : remplace le H par le deutérium

Commentaire

- new lesson
- Inter super!
- I.1 très bien → comparer vraiment les 2 protocoles.
- II.1 (d)

Mais je joins les techniques qu'on utilise lors de notre manip et mettre les pré-requis à filtrer

- III.1 pour faire spectre
- mettre sur transparent → voies de synthèse.
- on peut aussi parler de sélectivité, chine verte.
- par faire CCM pour faire le filtrage (éssorage)


Propositions correctrice.

14.


Idee manip: stratégie en synthèse organique

- synthèse du PhCO_2H Espace Bondes p 459

actuellement, en industrie




On compare cette synthèse à une synthèse de labo.



Parler des 12 pas de la synthèse

◦ synthèse sélective du paracetamol p 490 Bondes
Espace

◦ synthèse de la diclofenacine Belin p 248





intéressant car tableau de résultats où y a ± T,
± volume, ± n, ± tps; on pourra faire une manip
pour compléter! permet une analyse critique des modes
op.


◦ NaBH₄ sur l'acétate de vanille → séchage
d'un réactif Belin TS p 292

Montage à reflux pour la synthèse de l'aspirine


réfrigérant à eau




Montage DEAN-STARK



Purification par distillation



Spectre infra-rouge.



liaison	σ (cm^{-1})
HO	< 1500
C-C	< 1500
C-N	< 1500
C-O	< 1500
C=C	≈ 1600
C=N	1600 - 1700
C=O	≈ 1700
C-H	2800 - 3000
O-H	3200 - 3600
N-H	3100 - 3500

Acide
Acetylsalicylique

Spectre RMN

