

Exo 1:

$$a = \frac{1}{3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2+a}}} = \frac{1}{3 + \frac{1}{\frac{2+a+1}{2+a}}} = \frac{1}{3 + \frac{2+a}{3+a}} = \frac{1}{\frac{9+3a+2+a}{3+a}} = \frac{3+a}{4a+11}$$

$$\Leftrightarrow 4a^2 + 11a = 3+a \Leftrightarrow 4a^2 + 10a - 3 = 0$$

$$\Delta = 100 + 48 = 148 = 4 \times 37$$

$$a = \frac{-10 \pm 2\sqrt{37}}{8}. \text{ Comme } a > 0: \boxed{a = \frac{2\sqrt{37} - 10}{8}} = \frac{\sqrt{37} - 5}{4}$$

Exo 2: $\frac{-6}{x-3} < x+1 \quad D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$

$$f(x) = x+1 + \frac{6}{x-3}. \text{ On veut les } x \text{ tels que } f(x) > 0$$

$$f(x) = \frac{(x+1)(x-3)+6}{x-3} = \frac{x^2 - 2x + 3}{x-3}$$

$$\Delta = 4 - 12 < 0 \quad x^2 - 2x + 3 > 0$$

$$f \text{ est du signe de } x-3. \quad \text{Donc } \Psi =]3; +\infty[$$

Exo 3 $\boxed{1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}, \forall n \geq 1}$

Initialisation: Pour $n=1$ $1 = \frac{1 \times 2}{2}$ est vrai

Hérédité: Je prends un $n \geq 1$. Je suppose que $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$

On ajoute $n+1$:

$$1+2+\dots+n+(n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2} \quad \text{CQFD!}$$

Conclusion: D'après le principe de récurrence :

$$\boxed{\forall n \geq 1, 1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}}$$

$$\text{Exo 4 : } y'' - 2y' + 5y = 7\cos(2x) + 11\sin(2x) \quad \textcircled{1} \quad \text{Eq Homogène}$$

$$P(x) = x^2 - 2x + 5 \quad \Delta = 4 - 20 = -16 = (-4i)^2$$

les deux racines de P sont : $\frac{-2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i$

$$\text{Donc } \boxed{y_H = e^x (A\cos(2x) + B\sin(2x)) \text{ où } A, B \in \mathbb{R}}$$

\textcircled{2} Sol particulière : de la forme $y_P = a\cos(2x) + b\sin(2x)$

$$y_P' = -2a\sin(2x) + 2b\cos(2x); \quad y_P'' = -4a\cos(2x) - 4b\sin(2x)$$

$$y_P'' - 2y_P' + 5y_P = -4a\cos(2x) - 4b\sin(2x) + 4a\sin(2x) + 4b\cos(2x) + 5a\cos(2x) + 5b\sin(2x)$$

$$= (a - 4b)\cos(2x) + (4a + b)\sin(2x) = 7\cos(2x) + 11\sin(2x)$$

$$\text{Donc } \begin{cases} a - 4b = 7 \\ 4a + b = 11 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \xrightarrow{\times 4} \begin{cases} 4a - 16b = 28 \\ 4a + b = 11 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \xrightarrow{+4} \\ \xrightarrow{-4} \end{array} \begin{cases} 17b = -17 \\ 4a + b = 11 \end{cases} \quad \begin{array}{l} b = -1 \\ \xrightarrow{=} \end{array} \\ \begin{cases} a = 3 \\ b = -1 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \xrightarrow{=} \\ \xrightarrow{=} \end{array} \begin{cases} a = 12 \\ b = -1 \end{cases} \end{array}$$

$$a = 3 \text{ et } b = -1 \quad \boxed{y_P = e^x (3\cos(2x) - \sin(2x))}$$

\textcircled{3} Sols de l'eq complète : $y = e^x (A\cos(2x) + B\sin(2x) + 3\cos(2x) - \sin(2x))$

(Eq totale)

$$\text{Exo 5: } \vartheta(x) = x^2 + x - 1 - 3i$$

$$\Delta = 1 + 4 + 12i = 5 + 12i = (a+bi)^2 = a^2 - b^2 + i2ab$$

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 5 \\ 2ab = 12 \end{cases}$$

$$l_1 + l_2 : 2a^2 = 18 \Rightarrow a^2 = 9 \Rightarrow a = \pm 3$$

$$l_2 - l_1 : 2b^2 = 8 \Rightarrow b^2 = 4 \Rightarrow b = \pm 2$$

l_2 : a et b ont le même signe

$$\text{Donc } \Delta = (3+2i)^2$$


$$\text{les deux racines de } \Delta \text{ sont } \frac{-1 \pm (3+2i)}{2} = \boxed{\begin{aligned} &\frac{2+2i}{2} = 1+i \\ &-\frac{4-2i}{2} = -2-i \end{aligned}}$$

$$\text{Donc } \vartheta(x) = (x - (1+i))(x - (-2-i)) = \underline{(x-1-i)(x+2+i)}$$

Exo 6: les racines cubiques de $i = 1e^{i\pi/2}$ sont les $z_k = 1^{1/3} e^{i(\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3})}$ où $k=0, 1 \text{ ou } 2$

$$z_0 = \underline{e^{i\pi/6}} \quad z_1 = \underline{e^{i(\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3})} = e^{i\frac{13\pi}{6}}} \quad z_2 = \underline{e^{i(\frac{\pi}{6} + \frac{4\pi}{3})} = e^{i\frac{9\pi}{6}} = e^{i\frac{3\pi}{2}} = -i}$$

On peut les représenter dans le plan complexe :



Exo 7 : $f(x) = (2x+3)e^{1/x}$. En ∞ , $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, on peut faire la DL de e^x .

$$f(x) = (2x+3)\left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + O\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)$$

$$= 2x + 2 + \frac{1}{x} + O\left(\frac{1}{x}\right) + 3 + \frac{3}{2} + \frac{3}{2x^2} + O\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

$$= 5 + 2x + \frac{4}{x} + O\left(\frac{1}{x}\right)$$

L'asymptote à poser est $y = 5 + 2x$

la courbe est au dessus car $\frac{4}{x} > 0$

Exo 8 : $E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / 2x - 3y = 0\}$

• $2x_0 - 3y_0 = 0 - 0 = 0$, donc $(x_0, y_0) \in E$

• stabilité pour + : Je prends un vecteur $\vec{u}(x,y)$ et $\vec{v}(x,y') \in E$

$$\vec{u} + \vec{v} = (x + x', y + y')$$

$$2(x+x') - 3(y+y') = 2x + 2x' - 3y - 3y' = (2x - 3y) + (2x' - 3y') \\ = 0 + 0$$

\uparrow \uparrow
car $\vec{u} \in E$ car $\vec{v} \in E$

$$= 0. \text{ Donc } \underline{\vec{u} + \vec{v} \in E}$$

Donc E est stable pour +

• Stabilité pour - : Je prends un vecteur $\vec{u}(x,y) \in E$ et $a \in \mathbb{R}$

$$a\vec{u} = (ax, ay) \quad 2ax - 3ay = a(2x - 3y) = a \times 0 \text{ car } \vec{u} \in E \\ = 0 \text{ donc } \underline{a\vec{u} \in E}$$

Donc E est stable pour -

E est un sous-ds de \mathbb{R}^2

$$\text{Exo 8: } I = \int \frac{x}{(x^2+1)^3} dx \quad \text{durch } X = x^2+1 \quad \frac{dx}{dx} = 2x$$

$$\Rightarrow dx = \frac{dx}{2x} \cdot 2x = \frac{1}{2} \cdot 2x dx$$

$$\text{Dann } I = \int \frac{x}{x^3} \frac{dx}{2x} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{2} \int x^{-2} dx$$

$$I = \frac{1}{2} \frac{x^{-2}}{-2} = -\frac{1}{4} x^{-2} = -\frac{1}{4x^2}$$

$$\boxed{I = -\frac{1}{4(x^2+1)^2}}$$