

Problème 2

① $\vec{AB} = (1; -1; -1)$ et $\vec{AC} = (2; -5; -3)$

\vec{AB} et \vec{AC} ne sont pas colinéaires, donc A, B, C ne sont pas alignés

② $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & -5 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} = -\vec{u}$

\vec{AB} et $\vec{AC} \in (ABC)$, donc $\vec{u} \perp (ABC)$.

③ (ABC) a pour eq $2x - y + 3z = d$

AB passe par A : $2x_A - y_A + 3z_A = d = -5 + 3 = -2 = d$

(ABC) a pour eq cart: $2x - y + 3z = -1$

④ ~~cas x=0~~ $\Delta \left| \begin{array}{l} x = 2t + 7 \\ y = -t - 1 \text{ où } t \in \mathbb{R} \\ z = 3t + 4 \end{array} \right.$

⑤ $2x - y + 3z = 4t + 14 + t + 1 + 9t + 12 = 14t + 27 = -1 \Rightarrow 14t = -28 \Rightarrow t = -2$

Donc $H = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ③ $\mathcal{S}_1: x + y + z = d$ P₁: $x + y + z = 0$

④ $\mathcal{S}_2: \begin{cases} x = 4t \\ y = -t \\ z = t' + 3 \end{cases} \quad \begin{matrix} +2 \\ -1 \\ +3 \end{matrix} \text{ où } t, t' \in \mathbb{R}$

⑤ On élimine t et t' : L₁ + 4L₂: $x + 4y = -2$

$d(A, \mathcal{S}_2) = \frac{|x_A + 4y_A + 2|}{\sqrt{1^2 + 4^2}} = \frac{|16 + 2|}{\sqrt{17}} = \frac{18}{\sqrt{17}}$

$$\textcircled{6} \text{ (S)}: x^2 + (y-4)^2 + (z-1)^2 = 4$$

$\mathcal{L}(A, \mathcal{P}_2) = \frac{18}{\sqrt{17}} \neq 2$, donc S n'est pas tangente à \mathcal{P}_2

\textcircled{7} Un vecteur \perp à \mathcal{P}_1 est $\vec{v} = (1, 1, 1)$

Un vecteur \perp à \mathcal{P}_2 est $\vec{w} = (1, 4, 0)$

\vec{v} et \vec{w} ne sont pas colinéaires, donc \mathcal{P}_1 et \mathcal{P}_2 ne sont pas parallèles. Donc \mathcal{P}_1 et \mathcal{P}_2 sont sécants.

\textcircled{8} $\mathcal{L}_1: x+4y+z=0 \quad \left. \begin{array}{l} \text{on pose } y=t \\ \text{avec } \mathcal{L}_2: x=-4t-2 \end{array} \right.$

$\mathcal{L}_2: x+4y = -2 \quad \left. \begin{array}{l} \text{avec } \mathcal{L}_2: x = -4t-2 \\ \text{puis, avec } \mathcal{L}_1: z = -x-y = 4t+2 - t = 3t+2 \end{array} \right.$

Yes ! It goes !

\textcircled{9} La droite d a pour vecteur directeur $\vec{a} = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

Le plan (ABC) a pour équation $2x - y + 3z = -1$

Dans le plan vectoriel associé pour $\vec{R}: 2x - y + 3z = 0$

Avec les coordonnées de $\vec{a}: -8 - 1 + 9 = 0$

Donc \vec{a} est bien un vecteur directeur de (ABC) .

La droite d est parallèle à (ABC)