

exercice

$$\textcircled{1} \quad E = \left\{ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} + 2u_{n+1} + u_n = 0 \right\}$$

- Je prends 2 suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E$

On pose $w_n = u_n + v_n$

$$w_{n+2} + 2w_{n+1} + w_n = (u_{n+2} + v_{n+2}) + 2(u_{n+1} + v_{n+1}) + (u_n + v_n)$$
$$= (u_{n+2} + 2u_{n+1} + u_n) + (v_{n+2} + 2v_{n+1} + v_n)$$

$$= 0 + 0 = 0$$

\hookrightarrow car $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E$ \hookrightarrow car $(v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E$

donc $(w_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E$

donc E est stable pour +

- Je prends une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E$ et un réel α . On $v_n = \alpha u_n$

$$v_{n+2} + 2v_{n+1} + v_n = \alpha u_{n+2} + 2\alpha u_{n+1} + \alpha u_n = \alpha(u_{n+2} + 2u_{n+1} + u_n) = \alpha \times 0 \quad \text{car } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E$$
$$= 0. \quad \text{Donc } (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E \quad \text{E est stable pour } \alpha.$$

- $0 + 0 + 0 = 0$, donc la suite nulle $\in E$.
E est un SAV de l'ensemble des suites

$$U_{n+2} + 2U_{n+1} + U_n = 0 \quad P(x) = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$$

-1 est racine double. Solutions: $U_n = (A_n + Bn(-1)^n) = A(-1)^n + B(-1)^n$

$$E = \text{Vect} \left(\underbrace{\left((-1)^n \right)_{n \in \mathbb{N}}; \left(-1^n \right)_{n \in \mathbb{N}}}_{\text{base de } E}; \underbrace{E = 2}_{\text{dim}} \right)$$

$$\textcircled{3} \quad \varphi \begin{array}{l|} : \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x] \\ P(x) \mapsto x \varphi'(x) + 2 \varphi(x) \end{array}$$

var de $\mathbb{R}_3[x]$ dans $\mathbb{R}_3[x]$.
Il reste à montrer que φ est linéaire

Soit prendre φ et $\varphi' \in \mathbb{R}_3[x]$ et $a, b \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \varphi(a\varphi + b\varphi') &= x(a\varphi'(x) + b\varphi'(x))' + 2(a\varphi(x) + b\varphi(x)) \\ &= x(a\varphi'(x) + b\varphi'(x)) + 2a\varphi(x) + 2b\varphi(x), \\ &= a[x\varphi'(x) + 2\varphi(x)] + b[x\varphi'(x) + 2\varphi(x)] = a\varphi(\varphi) + b\varphi(\varphi') \end{aligned}$$

Donc φ est linéaire

Donc φ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_3[x]$

$$\varrho \in \text{Ker}(\varphi) \Leftrightarrow \varphi(\varrho) = 0 \Leftrightarrow x\varrho'(x) + 2\varrho(x) = 0$$

$$\varrho(x) = A e^{-\int \frac{2}{x} dx} = A e^{-2 \ln(x)} = A e^{\ln(x^{-2})} = A x^{-2} = \frac{A}{x^2}$$

Seul $\varrho = 0$ est une solution qui appartient à $R_3[x]$

$$\underline{\text{Ker}(\varphi) = \{0\}}$$

φ est injective

$$T \underline{\text{du rang}} : \dim \underset{0}{\left(\text{Ker}(\varphi) \right)} + \dim (\text{Im}(\varphi)) = \dim (R_3[x]) = 4$$

$$\text{donc } \left| \dim (\text{Im}(\varphi)) = 4 \right.$$

$\text{Im}(\varphi)$ est un sous espace de $R_3[x]$

$$\text{donc } \underline{\text{Im}(\varphi) = R_3[x]} \quad \underline{\text{f est surjective}}$$

- La base canonique de $R_3[x]$ est $B = (1, x, x^2, x^3)$

$$\text{Mat}_{\mathbb{Q}}(\varphi) = \begin{pmatrix} \varphi(1) & \varphi(x) & \varphi(x^2) & \varphi(x^3) \\ \text{dans} & \text{dans} & \text{dans} & \text{dans} \\ \mathbb{Q} & \mathbb{Q} & \mathbb{Q} & \mathbb{Q} \end{pmatrix}$$

$$\varphi(1) = x \cdot 0 + 0 \cdot 1 = +2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_B$$

$$\varphi(x_1) = x_1 \cdot 1 + 2x_2 = 3x_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_B$$

$$\varphi(x^2) = x_1 \cdot 2x_2 + 2x_2^2 = 4x_2^2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}_B$$

$$\varphi(x^3) = x_1 \cdot 3x_2^2 + 2x_2^3 = 5x_2^3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}_B$$

$$\text{Mat}_B(\varphi) = \underline{\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}}$$

(18) $F = \left\{ M(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}^2 \right\}$ d.h. $M(a, b) = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$

Se ponders $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$ et $A' = \begin{pmatrix} a' & b' & b' \\ b' & a' & b' \\ b' & b' & a' \end{pmatrix} \in F$

$$A + A' = \begin{pmatrix} a+a' & b+b' & b+b' \\ b+b' & a+a' & b+b' \\ b+b' & b+b' & a+a' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \beta \\ \beta & \alpha & \beta \\ \beta & \beta & \alpha \end{pmatrix} \text{ d.h. } (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$$

d.h. $A + A' \in F$ d.h. Feststabilität +

• Soit $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix} \in F$ et $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\alpha \cdot A = \begin{pmatrix} \alpha a & \alpha b & \alpha b \\ \alpha b & \alpha a & \alpha b \\ \alpha b & \alpha b & \alpha a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y & y \\ y & x & y \\ y & y & z \end{pmatrix} \text{ avec } x = \alpha a \text{ et } y = \alpha b$$

donc $\alpha A \in F$. Donc F est stable pour.

$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in F$ donc $a = b = 0$. Donc Fest un sous de $M_3(\mathbb{R})$

b) $\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix} = a \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{I} + b \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_A$. Donc $F = \text{Vect}(I, A)$
donc une base de $F = \text{Vect}(I, A)$
donc $|F| = L$

$\exists (A + I; A - 2I) = B'$. On suppose $a(A + I) + b(A - 2I) = O$
on montre que $a = b = 0$

$$a \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-2b & a+b & a+b \\ a+b & a-2b & a+b \\ a+b & a+b & a-2b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a-2b=0 & 1-4: 3b=0 \\ a+b=0 & \Rightarrow b=0 \\ a+b=0 & \Rightarrow a=0 \end{cases}$$

la famille $(A+F; A-2I)$ est libre

2 vecteurs libres dans un e.v de dimension 2 forment une base de F

$$\text{a)} M(a,b) = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ? \\ ? \\ ? \end{pmatrix}_B = \begin{pmatrix} a \\ \beta \\ ? \end{pmatrix}_B = \alpha(A+I) + \beta(A-2I)$$

$$\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha - \beta & \alpha + \beta & \alpha + \beta \\ \alpha + \beta & \alpha - 2\beta & \alpha + \beta \\ \alpha + \beta & \alpha + \beta & \alpha - 2\beta \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha - 2\beta = a \\ \alpha + \beta = b \end{cases} \quad L_2 - L_1: 3\beta = b - a \quad \beta = \frac{b-a}{3}$$

$$L_2: \alpha = b - \beta = b - \frac{b-a}{3} = \frac{3b-b+a}{3} = \frac{2b+a}{3}$$

$$M(a,b) = \frac{2b+a}{3}(A+I) + \frac{b-a}{3}(A-2I) = \begin{pmatrix} \frac{2b+a}{3} \\ \frac{b-a}{3} \end{pmatrix}_B$$

$$\textcircled{1} \quad E = \left\{ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} + 2u_{n+1} + u_n = 0 \right\}$$

- Je prends 2 suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ $\in E$ On pose $w_n = u_n + v_n$

$$\begin{aligned} w_{n+2} + 2w_{n+1} + w_n &= (u_{n+2} + v_{n+2}) + 2(u_{n+1} + v_{n+1}) + (u_n + v_n) \\ &= (u_{n+2} + 2u_{n+1} + u_n) + (v_{n+2} + 2v_{n+1} + v_n) \\ &= \underset{\in \text{car } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E}{0} + \underset{\in \text{car } (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E}{0} = 0 \end{aligned}$$

donc $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ $\in E$ donc E est stable pour +

- Je prends une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E$ et un réel α

$$\begin{aligned} (\alpha u_{n+2} + 2\alpha u_{n+1} + \alpha u_n) &= \alpha(u_{n+2} + 2u_{n+1} + u_n) = \alpha \cdot 0 \quad \text{car } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E \\ &= 0 \quad \text{donc } (\alpha u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E \quad E \text{ est stable pour } \alpha \end{aligned}$$

- $0 + 2 \cdot 0 + 0 = 0$, donc la uite nulle $\in E$ E est un SSV de l'ensemble des suites

$$u_{n+2} + 2u_{n+1} + u_n = 0 \quad P(x) = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$$

-1 est racine double Solutions: $u_n = (A_n + B_n(-1)^n)$

$$E = \text{Vect} \left(\underbrace{\left(n(-1)^n \right)_{n \in \mathbb{N}}; \left((-1)^n \right)_{n \in \mathbb{N}}}_{\text{base de } E}; \dim E = 2 \right)$$

③ $\varphi \mid R_3[x] \rightarrow R_3[x]$ φ va de $R_3[x]$ dans $R_3[x]$
 $\varphi(x) \mapsto x \varphi(x) + 2\varphi(x)$ Il reste à montrer que φ est linéaire

Je prouve φ et $\varphi \in R_3[x]$ et actifs 6/1R

$$\begin{aligned} \varphi(a\varphi + b\varphi)(x) &= x(a\varphi(x) + b\varphi(x))' + 2(a\varphi(x) + b\varphi(x)) \\ &= x(a\varphi'(x) + b\varphi'(x)) + 2a\varphi(x) + 2b\varphi(x) \\ &= a[x\varphi'(x) + 2\varphi(x)] + b[x\varphi'(x) + 2\varphi(x)] = a\varphi(\varphi) + b\varphi(\varphi) \end{aligned}$$

donc φ est linéaire donc φ est un endomorphisme de $R_3[x]$

$$\varphi \in \ker(\varphi) \Leftrightarrow \varphi(x) = 0 \Leftrightarrow x \varphi'(x) + 2\varphi(x) = 0$$

$$\varphi(x) = A e^{-\int \frac{2}{x} dx} = A e^{-2 \ln(x)} = A e^{\ln(x^{-2})} = A x^{-2} = \frac{A}{x^2}$$

Seel $\varphi = 0$ est une solution qui appartient à $R_3[x]$

$$\underline{\ker(\varphi) = \{0\}}$$

φ est injective

$$\text{Tr}\underline{\text{degang}}: \dim(\ker(\varphi)) + \dim(\text{Im}(\varphi)) = \dim(R_3[x]) = 4$$

0

$$\text{donc } \dim(\text{Im}(\varphi)) = 4$$

$\text{Im}(\varphi)$ est un sous de $R_3[x]$

$$\text{donc } \underline{\text{Im}(\varphi) = R_3[x]} \quad \text{est surjective}$$

- La base canonique de $R_3[x]$ est $B = (1, x, x^2, x^3)$

$$\text{Mat}_B(\varphi) = \begin{pmatrix} \varphi(1) & \varphi(x) & \varphi(x^2) & \varphi(x^3) \\ \dim B & \dim B & \dim B & \dim B \end{pmatrix}$$

$$\varphi(1) = x \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_3$$

$$\varphi(x) = x \cdot 1 + 2x = 3x \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(x^2) = x \cdot 2x + 2x^2 = 4x^2 \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(x^3) = x \cdot 3x^2 + 2x^3 = 5x^3 \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\text{Mat}_{\mathbb{Q}}(\varphi)} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

⑧ $F = \{M(a,b) \text{ où } (a,b) \in \mathbb{R}^2\}$ avec $M(a,b) = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$

So prendre $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$ et $A' = \begin{pmatrix} a' & b' & b' \\ b' & a' & b' \\ b' & b' & a' \end{pmatrix} \in F$

$$A+A' = \begin{pmatrix} a+\alpha & b+b' & b+b' \\ b+b', & a+\alpha' & b+b' \\ b+b', & b+b', & a+\alpha' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \beta \\ \beta & \alpha & \beta \\ \beta & \beta & \alpha \end{pmatrix} \text{ où } (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \text{ avec } \alpha = a+a' \text{ et } b+b'$$

donc $A+A' \in F$ donc F est stable par +

• Je prends $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix} \in F$ et $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\alpha A = \begin{pmatrix} \alpha a & \alpha b & \alpha b \\ \alpha b & \alpha a & \alpha b \\ \alpha b & \alpha b & \alpha a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y & y \\ y & x & y \\ y & y & x \end{pmatrix} \text{ avec } x = \alpha a \text{ et } y = \alpha b$$

donc $\alpha A \in F$

Donc F est stable parce que.

$$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = M(0,0)EF$$

Donc F est un sous-espace de $M_3(\mathbb{R})$

b) $\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix} = a \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{I} + b \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_A$ Donc $F = \text{Vect}(I, A)$ base de F
dim(F) = 2

c) $(A + I ; A - 2I) = \emptyset$ On suppose $a(A + I) + b(A - 2I) = O$
 (on montre que $a = b = 0$)

$$a \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-2b & a+b & a+b \\ a+b & a-2b & a+b \\ a+b & a+b & a-2b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a-2b=0 \\ a+b=0 \end{cases} \begin{matrix} \text{et} \\ \Rightarrow \end{matrix} \begin{cases} 3b=0 \\ b=0 \end{cases} \Rightarrow b=0 \Rightarrow a=0$$

la famille $(A+I, A-2I)$ est libre

2 vecteurs libres dans un espace de dim 2 forment une base de F

d) $M(a,b) = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ? \\ ? \\ ? \end{pmatrix}_B = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \beta \end{pmatrix}_B = \alpha(A+I) + \beta(A-2I)$

$$\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha-2\beta & \alpha+\beta & \alpha+\beta \\ \alpha+\beta & \alpha-2\beta & \alpha+\beta \\ \alpha+\beta & \alpha+\beta & \alpha-2\beta \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha-2\beta = a \\ \alpha+\beta = b \end{cases} \quad l_2-l_1: 3\beta = b-a \quad \beta = \frac{b-a}{3}$$
$$l_2: \alpha = b-\beta = b - \frac{b-a}{3} = \frac{3b-b+a}{3} = \frac{2b+a}{3}$$

$$M(a,b) = \frac{2b+a}{3}(A+I) + \frac{b-a}{3}(A-2I) = \begin{pmatrix} \frac{2b+a}{3} \\ \frac{b-a}{3} \\ \beta \end{pmatrix}$$