

Équations Différentielles d'ordre 2

I Equation Homogène $a(x)y''(x) + b(x)y'(x) + c(x)y(x) = 0$

On résout (ou on intègre) lorsque a, b et c sont des constantes.

Def: Le polynôme caractéristique associé à l'équa diff $ay''+by'+cy=0$

est $P(x) = ax^2 + bx + c$

1^{er} cas: $\Delta = b^2 - 4ac > 0$. Il y a deux racines réelles λ et μ

Sols: $y_H(x) = Ae^{\lambda x} + Be^{\mu x}$ où A et B sont dans \mathbb{R}

2^{er} cas: $\Delta = 0$. Il y a une racine double λ

Sols $y_H(x) = (Ax + B)e^{\lambda x}$ où $(A, B) \in \mathbb{R}^2$

3^{er} cas: $\Delta < 0$ Il n'y a pas de racine dans \mathbb{R} , mais il y en a dans \mathbb{C}

$-\Delta > 0$ les deux racines de C sont $-\frac{b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ $\Rightarrow \sqrt{\Delta} = i\sqrt{-\Delta}$
 les deux racines sont de la forme $a \pm iw$

Solutions: $y_H(x) = e^{\alpha x} (A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x))$ où $(A, B) \in \mathbb{R}^2$

amortissement pulsation

ex1: $y'' - 3y' + 2y = 0$

$$P(x) = x^2 - 3x + 2 \quad \Delta = 9 - 8 = 1 \quad 2 \text{ racines } \frac{3+1}{2}, \frac{3-1}{2} < 1$$

$$y_H = Ae^{2x} + Be^x \text{ où } A \text{ et } B \in \mathbb{R}$$

$$\text{ex2: } y'' + 4y' + 4y = 0$$

$$P(x) = x^2 + 4x + 4 = (x+2)^2 \quad \text{the racine double -2}$$

sols:

$$y_H(x) = (Ax+B)e^{-2x} \text{ où } (A, B) \in \mathbb{R}^2$$

$$\text{ex3: } y'' - 2y' + 2y = 0$$

$$P(x) = x^2 - 2x + 2 \quad \Delta = 4 - 8 = -4 = (2i)^2$$

$(\sqrt{\Delta} = 2)$

les deux racines sont : $\frac{2 \pm 2i}{2} \leftarrow \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$

$$1 \pm 1i$$

Sols: $y_H = e^{1x} (A \cos(1x) + B \sin(1x))$ où $A, B \in \mathbb{R}$

$$y_H = e^x (A \cos x + B \sin x)$$

L'ensemble des solutions E de l'équa diff $ay'' + by' + cy = 0$
est stable pour l'addition

c'est à dire si f et g sont dans E , alors $f+g \in E$

[Je prends deux solutions f et g de l'équa diff $ay'' + by' + cy = 0$.
($af'' + bf' + cf = 0$ et $ag'' + bg' + cg = 0$)

$$\begin{aligned} \underline{\underline{a(f+g)'' + b(f+g)' + c(f+g)}} &= a(f'' + g'') + b(f' + g') + c(f + g) \\ &= af'' + ag'' + bf' + bg' + cf + cg \\ &= (af'' + bf' + cf) + (ag'' + bg' + cg) \\ &= \underset{\substack{\uparrow \\ \text{car } f \text{ est sol}}}{0} + \underset{\substack{\uparrow \\ \text{car } g \text{ est sol}}}{0} = \underline{\underline{0}} \end{aligned}$$

donc $f+g$ est solution E est stable pour +

II Solution particulière lorsque les coefficients a, b, c sont constants
et lorsque le second membre est simple

Si le second membre est :

- Un polynôme
- $\alpha \cos(\omega x) + \beta \sin(\omega x)$
- polynôme $\times e^{\lambda x}$

alors une sol particulière est :

- Un polynôme de même degré
- $\gamma \cos(\omega x) + \delta \sin(\omega x)$
- (polynôme de même degré) $\times e^{\lambda x}$

et si ça ne marche pas, on multiplie par x
voire par x^2

$$\text{ex 1: } y'' + 2y' + 2y = x+1$$

HOM $y'' + 2y' + 2y = 0 \quad P(x) = x^2 + 2x + 2 \quad \Delta = 4 - 8 = -4 = (2i)^2$
2 racines: $\frac{-2 \pm 2i}{2} = -1 \pm i$ Sol: $y_H = e^{-x}(A\cos(x) + B\sin(x))$

Sol partculaire: $y_2 = ax + b \quad y_2' = a \quad y_2'' = 0$

$$y_2'' + 2y_2' + 2y_2 = x+1 \Leftrightarrow 0 + 2a + 2(ax+b) = x+1 \\ \Leftrightarrow 2ax + (2a+2b) = x+1$$

$$\begin{cases} 2a = 1 \\ 2a+2b = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} a &= \frac{1}{2} \\ 2b+1 &= 1 \Rightarrow b = 0 \end{aligned} \quad y_2 = \frac{1}{2}x$$

Sols de l'éq complète: $y = e^{-x}(A\cos(x) + B\sin(x)) + \frac{1}{2}x$

où A et $B \in \mathbb{R}$

$$\text{ex2: } y'' - 2y' = x+1$$

$$\underline{\text{HOM: }} y'' - 2y' = 0 \quad P(x) = x^2 - 2x = x(x-2) \quad \text{2 racines 0 et 2}$$

$$\text{sols. } y_H = A e^{0x} + B e^{2x}$$

$$y_H = A + B e^{2x} \text{ où } (A, B) \in \mathbb{R}^2$$

$$\underline{\text{Sol particulière: }} y_2 = ax+b \quad y_2' = a \quad y_2'' = 0$$

$$y_2'' - 2y_2' = -2a = x+1$$

cste fonction de x ?? ? Impossible

$$\text{On x pour } y_2 = ax^2 + bx \quad y_2' = 2ax + b \quad y_2'' = 2a$$

$$y_2'' - 2y_2' = 2a - 2(2ax+b) = -4ax + 2a - 2b = x + 1$$

$$\begin{cases} -4a = 1 \\ 2a - 2b = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{4} \\ 2b = 2a - 1 = -\frac{1}{2} - 1 = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

$$b = -\frac{3}{4}$$

$$y_2 = -\frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{4}x$$

$$\text{Sols de l'éq complète : } y = A + B e^{2x} - \frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{4}x$$

$$\text{ex3: } y'' + y' + y = 13 \cos(2x)$$

$$\text{HOM: } y'' + y' + y = 0 \quad P(x) = x^2 + x + 1 \quad \Delta = 1 - 4 = -3 = (i\sqrt{3})^2$$

$$2 \text{ racines: } \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$y_H = e^{-\frac{1}{2}x} \left(A \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + B \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) \right)$$

$$\text{Sol partculaire: } y_2 = a \cos(2x) + b \sin(2x)$$

$$y'_2 = -2a \sin(2x) + 2b \cos(2x) \quad y''_2 = -4a \cos(2x) - 4b \sin(2x)$$

$$y''_2 + y'_2 + y_2 = (-4a \cos(2x) - 4b \sin(2x)) + (-2a \sin(2x) + 2b \cos(2x)) + (a \cos(2x) + b \sin(2x))$$

$$= [-3a + 2b] \cos(2x) + [-3b - 2a] \sin(2x)$$

$$= 13 \cos(2x) + 0 \sin(2x)$$

$$\begin{cases} -3a + 2b = 13 \\ -2a - 3b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \times 3 \\ \times 2 \end{cases} \begin{cases} -9a + 6b = 39 \\ -4a - 6b = 0 \end{cases} \begin{cases} \leftarrow l_1 + l_2 \\ -5a = 39 \end{cases} \begin{cases} -5a - 6b = 0 \\ -5a = 39 \end{cases}$$

$$\Rightarrow a = -3 \quad \text{et} \quad 6b = -5a = 12 \quad b = 2$$

$$y_2 = -3 \cos(2x) + 2 \sin(2x)$$

Solo de l'dg complete:

$$y = e^{-\frac{1}{2}x} \left(A \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + B \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) \right) - 3 \cos(2x) + 2 \sin(2x)$$

ex4: $y'' + y = \cos(x)$

HOM: $y'' + y = 0$ $P(x) = x^2 + 1$ $\Delta = -4 = (2i)^2$

2 racines. $\frac{0 \pm 2i}{2} = \pm i$ $y_H = e^{ox} (A \cos(x) + B \sin(x))$

$$y_H = A \cos(x) + B \sin(x) \text{ où } A \text{ et } B \in \mathbb{R}$$

Sol particuli  e: $y_p = a \cos(x) + b \sin(x)$ $y_p' = -a \sin(x) + b \cos(x)$

$$y_p'' = -a \cos(x) - b \sin(x)$$

$$y''_{p1} + y_{p1} = -a \cos(x) - b \sin(x) + a \cos(x) + b \sin(x) = 0 = \cos x ???$$

IMPOSSIBLE

en fait $y_p = x(a \cos(x) + b \sin(x))$