

exo 7 . asymptote au +∞ de  $f(x) = (2x+3)e^{''x}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = (+\infty \cdot e^0 = +\infty \cdot 1) - +\infty \quad \text{asymptote oblique ?}$$

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2 + \frac{3}{x}) e^{''x} = 2 \times e^0 = \underline{\underline{2 = a}}$$


$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x+3)e^{''x} - 2x \underset{\begin{array}{c} \text{v. } x \rightarrow +\infty \\ \downarrow \\ +\infty \end{array}}{\underset{\begin{array}{c} \text{v. } e^{''x} \rightarrow 1 \\ \downarrow \\ 1 \end{array}}{\underset{\begin{array}{c} \text{v. } -x \rightarrow -\infty \\ \downarrow \\ -\infty \end{array}}{\underset{\begin{array}{c} \text{v. } 3 \rightarrow 0 \\ \downarrow \\ 0 \end{array}}{= 1 \cdot \infty - \infty \text{ f. I}}}}} = 1 \cdot \infty - \infty$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( (2x+3) \left[ 1 + \frac{1}{x} + \Theta(\frac{1}{x}) \right] - 2x \right)$$


$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x + 3 + \underbrace{\Theta(1) + \left( \frac{3}{x} + \Theta(\frac{1}{x}) \right)}_{\rightarrow 0} - 2x$$

$$= 5 \quad \text{asymptote } \underline{\underline{y = 2x+5}}$$




$$\begin{cases} x(t) = \cos^3(t) \\ y(t) = \sin^3(t) \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \cos(-t) &= \cos(t) \\ \sin(-t) &= -\sin(t) \end{aligned}$$



$$M(\pi - t) = ? \quad \cos(\pi - t) = -\cos(t) \quad \text{et} \quad \sin(\pi - t) = \sin(t)$$



$$\cos(\frac{\pi}{2} - t) = \sin t \quad \text{et} \quad \sin(\frac{\pi}{2} - t) = \cos t$$

période  $\pi$ , donc, on a toute la courbe en étudiant sur  $[-\pi, \pi]$

- Si  $t$  vaut de  $0$  à  $\pi$ , alors  $-\pi - t$  vaut de  $0$  à  $-\pi$

donc Etude sur  $[0, \pi]$  + sym /ox, on relèvera les pts  
pour  $t \in [-\pi; 0]$

- Si  $t$  vaut de  $0$  à  $\frac{\pi}{2}$  alors  $\pi - t$  vaut de  $\pi$  à  $\frac{\pi}{2}$

donc Etude sur  $[0, \frac{\pi}{2}]$  + sym /oy, on relèvera les pts  
pour  $t \in [\frac{\pi}{2}; \pi]$

- Si  $t$  vaut de  $0$  à  $\frac{\pi}{4}$  alors  $\frac{\pi}{2} - t$  vaut de  $\frac{\pi}{2}$  à  $\frac{\pi}{4}$

donc Etude sur  $[0, \frac{\pi}{4}]$  + sym /droite d'éq y = x,  
on relèvera la droite sur  $[0, \frac{\pi}{2}]$

# SUITES

## I Vocabulaire

def: La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est convergente lorsque  
ou  
converge

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$  existe et  
est finie

abréviation: On écrit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  CV

def: La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  diverge lorsque elle ne converge pas  
ou  
est divergente

abréviation:  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  DIV

def: La suite  $(l_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est minorée lorsque il existe  $m \in \mathbb{R}$  tel que  
 $m \leq l_n, \forall n \in \mathbb{N}$

def: la suite  $(l_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est majeure lorsque il existe  $M \in \mathbb{R}$  tel que  
 $l_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}$

def: La suite  $(l_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est bornée lorsque | il existe  $m$  et  $M \in \mathbb{R}$  tels que  
|  $\forall n \in \mathbb{N}, m \leq l_n \leq M$

borné = majoré + minoré

| T1

Toute suite convergente est bornée

def. la suite  $(l_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante (strictement croissante)  
lorsque

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad l_n \leq l_{n+1} \quad (\text{tous } n, \quad l_n < l_{n+1})$$

def. la suite  $(l_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante (strict décroissante)  
lorsque

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad l_n \geq l_{n+1} \quad (l_n > l_{n+1})$$

def. une suite est monotone lorsque elle est croissante  
ou décroissante

I<sub>2</sub>

Toute suite croissante et majorée CV

I<sub>2'</sub>

Toute suite décroissante et minorée CV

ex 1:  $u_0 = 2$

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{\sqrt{u_n + 1}}$$

que:  $u_n > 0$ , t.n.GN

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{\sqrt{u_n + 1}} < 1 \quad (u_n > 0 \Rightarrow u_n + 1 > 1 \Rightarrow \sqrt{u_n + 1} > 1)$$

donc  $u_{n+1} < u_n$ , t.n.GN. Donc  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est strictement décroissante

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante et minorée (par 0), donc elle converge vers l

$$u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l$$

$$u_{n+1} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l = \frac{l}{\sqrt{l+1}} \Rightarrow \begin{cases} l = \frac{1}{\sqrt{l+1}} \Rightarrow l^2 + l - 1 = 0 \\ \text{ou} \\ l = 0 \end{cases}$$

ici,  $l=0$

$$\text{ex2 : } u_0 = 2 \quad u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1}$$

$$\left( \begin{array}{l} u_{n+1} - u_n = \sqrt{u_n + 1} - u_n \quad ?? \geq 0 ? \leq 0 ? \\ \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\sqrt{u_n + 1}}{u_n} \quad \geq 1 ? \quad \leq 1 ? \quad ? \end{array} \right)$$

$$u_1 = \sqrt{u_0 + 1} = \sqrt{2+1} = \sqrt{3} \approx 1,732 \dots < u_0$$

Montreons que cette suite est décroissante par récurrence

$$\text{cad } \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} \leq u_n$$

Initialisation: pour  $n=0$      $u_1 = 1,7 \leq u_0 = 2$     oui

Hérédité: Je prends  $u_n$      $n \geq 0$ . Je suppose que     $u_{n+1} \leq u_n$   
(on doit montrer que     $u_{n+2} \leq u_{n+1}$ )

$$u_{n+1} \leq u_n$$

on ajoute 1 :  $u_{n+1} + 1 \leq u_n + 1$

on prend la  $\sqrt{\phantom{x}}$  :  $\sqrt{u_{n+1} + 1} \leq \sqrt{u_n + 1}$  car  $\sqrt{\phantom{x}}$  est une fonction croissante  
||

$$u_{n+2} \leq u_{n+1} \quad \text{Fin}$$

Conclusion : D'après le principe de récurrence :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq u_n$

La suite est croissante

Elle est aussi minorée (par 0), donc elle CV vers l.

$$u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1} \Rightarrow l = \sqrt{l+1} \Rightarrow l^2 = l+1 \Rightarrow l^2 - l - 1 = 0$$
$$\Delta = 5 \quad l = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \quad l \geq 0 \quad \text{donc } l = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

def : La suite  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est équivalente à la suite  $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$

lorsque

$$\boxed{\frac{U_n}{V_n} \xrightarrow{+ \infty} 1}$$

$$U_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} V_n$$

def : La suite  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est négligeable devant  $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$

lorsque

$$\boxed{\frac{U_n}{V_n} \rightarrow 0}$$

$$U_n = o(V_n)$$

T<sub>3</sub> Si  $U_n = O_n + \omega_n$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$

$(\omega_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est négligeable devant  $(O_n)_{n \in \mathbb{N}}$

$$\text{alors } U_n \underset{+ \infty}{\sim} O_n$$

T<sub>3'</sub> Une suite est équivalente à la partie principale de son DL (premier terme non nul)  
Obs en  $\left(\frac{1}{n}\right) \xrightarrow{+0}$

ex3: DL à l'ordre 2 de  $u_n = \frac{n}{n+1}$   $\triangleleft n \rightarrow +\infty$

$$u_n = \frac{n}{n(1+\frac{1}{n})} = \frac{1}{1+\frac{1}{n}}$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 + \mathcal{O}(x^2)$$

on a mis le plus grand en facteur

$$u_n = 1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$\left( \begin{array}{l} u_n \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} 1 \\ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ CV vers } 1 \end{array} \right)$$

ex4: DL à l'ordre 1 de  $u_n = \left(1 + \frac{\varrho}{n}\right)^n = e^{n \ln(1 + \frac{\varrho}{n})}$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \mathcal{O}(x^2).$$

$$u_n = e^{\varrho - \frac{\varrho^2}{n} + \mathcal{O}(\frac{1}{n})} = e^\varrho \cdot e^{-\frac{\varrho^2}{n} + \mathcal{O}(\frac{1}{n})}$$

$$u_n = e^\varrho - 2e^\varrho \frac{\varrho^2}{n} + \mathcal{O}(\frac{1}{n})$$

$$(u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} e^\varrho)$$