

$$\boxed{3} \quad g : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y, z) \longmapsto (x+y-z, x+2y)$$

on prend $\vec{u}(x, y, z)$ et $\vec{v}(x', y', z')$
et $(a, b) \in \mathbb{R}^2$

$$g(a\vec{u} + b\vec{v}) = g \left(\underbrace{(ax, ay, az)}_a + \underbrace{(bx', by', bz')}_b \right) = g \left(\underbrace{ax + bx'}_x; \underbrace{ay + by'}_y; \underbrace{az + bz'}_z \right)$$

$$= (x+y-z; x+2y)$$

$$= (ax + bx' + ay + by' - (az + bz'); ax + bx' + 2(ay + by'))$$

$$= (ax + ay - az; ax + 2ay) + (bx' + by' - bz'; bx' + 2by')$$

$$= a(x+y-z; x+2y) + b(x'+y'-z'; x'+2y')$$

$$= a \quad g(\vec{u}) \quad + \quad b \quad g(\vec{v})$$

donc g est linéaire

$$\vec{u} (x, y, z) \in \text{ker}(g) \Leftrightarrow g(\vec{u}) = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow (x+y-z; x+2y) = (0,0)$$

$$\begin{cases} x+y-z=0 \\ x+2y=0 \end{cases}$$

Il y a 2 équations et 3 variables, donc 1 paramètre.
On pose $y=t \Rightarrow x=-2t$

$$\therefore z = x+y = -2t+t = -t \quad \text{ker}(g) = \left\{ \begin{pmatrix} -2t \\ t \\ -t \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}.$$

$$= \text{Vect}(\vec{\alpha}) \quad \text{où } \vec{\alpha} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\text{ker}(g) \neq \{\vec{0}\}$ donc g n'est pas injective

$$\text{T de } \text{reg} : \dim(\text{ker}(g)) + \dim(\text{Im}(g)) = \dim(\mathbb{R}^3)$$

$$1 + 2 = 3$$

$$\text{Im}(g) \text{ est un sous de } \mathbb{R}^2$$

dim(Im(g)) = 2

donc $\text{Im}(g)$ est un plan de \mathbb{R}^3

$\text{Im}(g) = \mathbb{R}^2$

$$3e^{i\frac{\pi}{2}} = 3i$$

$$2e^{i\frac{\pi}{3}} = 2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1+i\sqrt{3}$$

$$\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 1-i$$

$$4e^{i\frac{5\pi}{6}} = 4\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}\right) = -2\sqrt{3}+2i$$

$$3e^{i\pi} = -3 = 3e^{-i\pi}$$


$$2e^{i\frac{7\pi}{3}} = 2e^{i\left(\frac{7\pi}{3} - 2\pi\right)} = 2e^{i\frac{\pi}{3}} = 1+i\sqrt{3}$$

$$2e^{i\frac{2017\pi}{3}}$$

$$\begin{array}{r} \overline{2017} \\ \times 3 \\ \hline -18 \\ -4 \\ \hline 07 \\ -6 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$2017 = 3 \times 672 + 1$$

$$2e^{i\frac{2017\pi}{3}} = 2e^{i\frac{3 \times 672+1}{3}\pi} = 2e^{i672\pi + i\frac{\pi}{3}} = 2e^{i\frac{\pi}{3}} = 1+i\sqrt{3}.$$




$$-i^7 = -i^{4 \cdot 3} \\ = -1 \cdot (-i) = i$$

$$i^2 = -1 \quad i^3 = -i \quad i^4 = 1$$

Rappel: $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$

$$\frac{2+i}{3-4i} = \frac{(2+i)(3+4i)}{9+16} = \dots$$



$$\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

$$\frac{1+e^{ix}}{1-e^{ix}} = \frac{e^{ix/2}}{\cancel{e^{-ix/2}}} \frac{(e^{-ix/2} + e^{ix/2})}{(e^{-ix/2} - e^{ix/2})} = -\frac{\cos(x/2)}{i \sin(x/2)} \frac{x i}{i}$$

$-2i \sin(x/2)$

$$= -\frac{\cos(x/2) i}{-\sin(x/2)} = i \frac{\cos(x/2)}{\sin(x/2)}$$

$\uparrow i^2$

$$-7 = 7e^{i\pi}$$

$$-\frac{1}{3}i = \frac{1}{3} e^{-i\pi/2}$$



$$12+5i = z \quad |z| = \sqrt{144+25} = \sqrt{169} = 13$$

$$z = 13 \left(\frac{12}{13} + \frac{5}{13}i \right) = \underline{13e^{i\theta}} \text{ où } \theta = \arctan\left(\frac{5}{12}\right)$$

$$\underbrace{-3e^{i\pi/6}}_{=} = e^{-i\pi} \cdot 3e^{i\pi/6} = 3e^{i\frac{\pi}{6}-\pi} = 3e^{-i\frac{5\pi}{6}} \left(= 3e^{i\frac{7\pi}{6}}\right)$$

$$\sqrt{3}-i = z \quad |z| = \sqrt{3+1} = 2$$



$$z = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \right) = 2 e^{-i\pi/6}$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^7 = \left(\frac{1}{2e^{-i\pi/6}}\right)^7 = \frac{1}{2^7} (e^{i\pi/6})^7 = \frac{1}{128} e^{i\frac{7\pi}{6}} = \frac{1}{128} e^{i\frac{25-2\pi}{6}}$$
$$= \frac{1}{128} e^{-i\frac{5\pi}{6}}$$


$$\frac{\sqrt{2}}{1-i} \frac{x+i}{1+ix} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}i}{1+i} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i = e^{i\pi/4}$$

$$1+e^{ix} = e^{ix/2} \left(e^{-ix/2} + e^{ix/2} \right) = \underbrace{\cos(\frac{x}{2})}_{\text{modulus}} e^{i\frac{x}{2}}$$

↙ argument

$$\cos x - i \sin x = \cos(-x) + i \sin(-x) = e^{-ix}$$

$$\sin x + i \cos x = \cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = e^{i\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}$$



Polynômes à coefficients dans \mathbb{R} ou \mathbb{C}

① Polynômes de degré 2

$$P(x) = a x^2 + b x + c$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$2 \text{ racines : } -\frac{b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$\begin{cases} \text{si } \Delta > 0 : 2 \text{ racines} \\ \text{si } \Delta = 0 : 1 \text{ racine double} \\ \text{si } \Delta < 0 : \text{pas de racine} \end{cases}$
dans \mathbb{R}

$P(x)$ est du même signe que a à l'extérieur des racines

Factorisation dans \mathbb{R} : $P(x) = 2x^2 - 4x - 6$

$$\Delta = 16 + 48 = 64 = 8^2$$


$$2 \text{ racines : } \frac{4 \pm 8}{4} = \begin{cases} 3 \\ -1 \end{cases}$$

$$2x^2 - 4x - 6 = 2(x-3)(x+1)$$



a est racine de $P(x) \iff$ on peut factoriser par $x-a$

faktorisieren durch C: $\vartheta(x) = 3x^2 + (3-9i)x - 6-3i$
 $= 3 \underbrace{(x^2 + (1-3i)x - 2-i)}_{\Delta = (1-3i)^2 + 4(2+i)}$



Die 2 Wurzeln corresp. zu $\operatorname{Re}^{i\vartheta}$ s. $\pm \sqrt{\Delta} e^{i\frac{\vartheta}{2}}$

$$\begin{cases} \Delta = 9 \\ \sqrt{\Delta} = \sqrt{2} \end{cases}$$



2 Wurzeln: $\frac{-(1-3i) \pm (1-i)}{2}$

$$= \sqrt{2} \left(\frac{1}{2} - i \frac{1}{2} \right) = 1-i$$

$$\frac{-1+3i+1-i}{2} = \frac{2i}{2} = i \quad \text{et} \quad \frac{-1+3i-1+i}{2} = \frac{-2+4i}{2} = -1+2i$$

$3x^2 + (3-9i)x - 6-3i = 3(x-i)(x+1-2i)$

II Généralités

Notation : L'ensemble des polynômes à coefficient dans \mathbb{R} se note $\mathbb{R}[x]$
C se note $\mathbb{C}[x]$

On dit que $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ est un polynôme de degré n
quand $a_n \neq 0$

L'ensemble des polynômes de degré $\leq n$ se note $\mathbb{R}_n[x]$ ou $\mathbb{C}_n[x]$
inférieur ou égal à n

Division Euclidienne

quotient reste
↓ ↓

$\exists A \neq 0 \quad B \in \mathbb{R}[x]$. Il existe un unique couple (Q, R) tel que

$$\left\{ \begin{array}{l} B = A Q + R \\ \deg R < \deg A \end{array} \right.$$

ex1. On divise $B = x^5 + 2x^3 - 3x - 2$ par $A = x^3 + x + 1$

$$\begin{array}{r} x^5 + 2x^3 - 3x - 2 \\ - (x^5 + x^3 + x^2) \\ \hline x^3 - x^2 - 3x - 2 \\ - (x^3 + x^2 + x) \\ \hline -x^2 - 4x - 3 \end{array}$$

$$x^5 + 2x^3 - 3x - 2 = (x^3 + x + 1)(x^2 + 1) - x^2 - 4x - 3$$

ex2 Quel est le reste de la division Euclidienne de $P(x) = x^n + x + 1$ par $x - 1$?

Il existe un unique couple (Q, R) tel que

$$\left\{ \begin{array}{l} x^n + x + 1 = (x-1)Q(x) + R(x) \\ \deg(R) < \deg(x-1) = 1 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow R = \text{cste}$$

Valeur en 1 dans L : $1^n + 1 + 1 = 0_x Q + R \Rightarrow R|_{x=1} = 3$

ex 3: Reste de la division Euclidien de $(x-2)^{2022} + (x-1)^{1011} + 1$ par $(x-1)(x-2)$?

$$(x-2)^{2022} + (x-1)^{1011} + 1 \quad | \quad x^2 - 3x + 2$$

\dots

$\alpha(x)$

$R(x)$

□ Il existe un unique couple (Q, R) tel que

$$(x-2)^{2022} + (x-1)^{1011} + 1 = (x^2 - 3x + 2)Q(x) + R(x)$$

$$\left| \deg(R(x)) < 2 \quad \Rightarrow \quad R(x) = \alpha x + b \right.$$

Valeur en 1 : $(1-2)^{2022} + (1-1)^{1011} + 1 = 0 + \alpha + b \quad \begin{cases} \alpha + b = 2 \\ \end{cases}$

Valeur en 2 : $(2-2)^{2022} + (2-1)^{1011} + 1 = 0 + 2\alpha + b \quad \begin{cases} 2\alpha + b = 2 \\ \end{cases}$

$$L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \quad \begin{cases} \alpha + b = 2 \\ \alpha = 0 \end{cases} \Rightarrow b = 2$$

R(x) = 2

def: a est une racine de \mathcal{P} lorsque $\mathcal{P}(a) = 0$

T: a est racine de $\mathcal{P} \Leftrightarrow$ On peut factoriser \mathcal{P} par $x-a$
ou encore

$$\exists Q \in \mathbb{R}[x] / \mathcal{P}(x) = (x-a)Q(x)$$

def: La multiplicité d'une racine a du polynôme $\mathcal{P} \in \mathbb{R}[x]$
est le plus grand entier n tel que " \mathcal{P} se factorise par $(x-a)^n$ "
ou encore
" $\exists Q / \mathcal{P}(x) = (x-a)^n Q(x)$ "

ex: $\mathcal{P}(x) = 8x^3(x-2)^7(x+5)^2$

\mathcal{P} a trois racines : 0 ; 2 ; et -5

0 est de multiplicité 3

$$\begin{array}{r} 2 \\ \hline -5 \end{array}$$

on dit aussi que -5 est une racine double

III Décomposition dans $\mathbb{R}[x]$ ou dans $\mathbb{C}[x]$:

T₁

tous les polynômes de $\mathbb{C}[x]$ se décomposent en produits de polynômes de degré 1

T₂

Tous les polynômes de $\mathbb{R}[x]$ se décomposent en produits de polynômes de degré 1 et de poly. de degré 2 dont le discriminant < 0.

$$\Delta < 0$$

ex 1 : $x^4 + 1 = \varnothing(x)$ Il n'a pas de racines dans \mathbb{R} car $\varnothing(x) > 1 > 0$


dans \mathbb{C} , il a 4 racines:

$$x^4 + 1 = 0 \Leftrightarrow x^4 = -1 = e^{i\pi}$$

les racines 4 ième de $-1 = e^{i\pi}$ sont les $z_k = e^{i(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{4})}$

$$e^{i\pi/4} = z_1 \quad z_0 = e^{i\pi/4}$$

$$e^{-i\pi/4} = z_2 \quad z_3 = e^{-i\pi/4}$$



$$\text{où } k = 0, 1, 2 \text{ ou } 3$$

Factorisierung: $x^4 + 1 = (x - e^{i\frac{\pi}{4}})(x - e^{-i\frac{\pi}{4}})(x - e^{i\frac{3\pi}{4}})(x - e^{-i\frac{3\pi}{4}})$
dans $\mathbb{C}[x]$

$$\begin{aligned}x^4 + 1 &= \left(x^2 - xe^{i\frac{\pi}{4}} - xe^{-i\frac{\pi}{4}} + e^{i\frac{\pi}{4}}e^{-i\frac{\pi}{4}} \right) \left(\right. \\&= \left(x^2 - x \underbrace{\left(e^{i\frac{\pi}{4}} + e^{-i\frac{\pi}{4}} \right)}_{2\cos(\frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}} + 1 \right) \left(x^2 - x \underbrace{\left(e^{i\frac{3\pi}{4}} + e^{-i\frac{3\pi}{4}} \right)}_{2\cos(\frac{3\pi}{4}) = -\sqrt{2}} + 1 \right)\end{aligned}$$

Decomp dans $\mathbb{R}[x]$:

$$x^4 + 1 = (x^2 - \sqrt{2}x + 1)(x^2 + \sqrt{2}x + 1)$$