


① def de  $\text{ker}(f)$ :

$$\text{ker}(f) = \{\vec{u} / f(\vec{u}) = \vec{0}\}$$

$$\vec{u} \in \text{ker}(f) \Leftrightarrow f(\vec{u}) = \vec{0}$$

② dessin de  $\arctan(x)$



③ dérivée de  $\arctan(x)$

$$(\arctan)' = \frac{1}{1+x^2}$$

④ DL de  $\frac{1}{1+x}$  à l'ordre n

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - + (-1)^n x^n + \Theta(x^n)$$

⑤  $\sin(x)$  en fonct.

$\cos(2x)$  de 2 façons différentes

$$\cos(2x) = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$$

$$\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2} \left( \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = 1+i$$

$$-e^{i\pi} = -(-1) = 1$$

$$e^{i37\frac{\pi}{2}} = e^{i\left(\frac{7\pi}{2} - \cancel{\left(\frac{36\pi}{2}\right)}\right)} = e^{i\frac{\pi}{2}} = i$$

$$2e^{i\frac{\pi}{3}} = 2 \left( \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 1 + i\sqrt{3}$$

$$2e^{i\frac{11\pi}{3}} = 2e^{i\left(\frac{4\pi}{3} - 4\pi\right)} = 2e^{-i\frac{8\pi}{3}} = 2 \left( \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 1 - i\sqrt{3}$$

$$37 = 37e^{i0} ; \quad 2i = 2e^{i\frac{\pi}{2}} ; \quad -5 = 5e^{i\pi}$$

Rappel. les T des croissances comparées

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(n)}{n^a} = 0 \quad (a > 0,$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^n}{n^a} = +\infty \quad (a > 0)$$

Nouveau

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{e^n} = +\infty$$

$$\boxed{\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{(n+1)!}{e^{n+1}}}{\frac{n!}{e^n}} = \frac{(n+1)!}{e^{n+1}} \times \frac{e^n}{n!} = \frac{n+1}{e}}$$

$$\text{Si } n > 2, \text{ alors } \frac{u_{n+1}}{u_n} > \frac{3}{e} > 1 \quad u_{n+1} > \frac{3}{e} u_n$$

$\forall n \geq 2 \quad l_{n+1} > \frac{3}{e} l_n$ , donc  $l_{n+2} > \left(\frac{3}{e}\right)^n l_2 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$   
 donc  $l_{n+2} \rightarrow +\infty$  ( $\vdash$  des gendarmes,  $l_0 \rightarrow +\infty$ )

## II les suites arithmétiques

Def 1:  $(l_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est arithmétique si  $\exists r \in \mathbb{R} / \forall n \in \mathbb{N} \quad l_n = l_0 + nr$   
 $r$  s'appelle la raison de la suite

Def 2  $(l_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est arithmétique lorsque  $\exists r \in \mathbb{R} / \forall n \in \mathbb{N} \quad l_n = l_0 + nr$

T1

$$1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \forall n \geq 1$$

T2 Si  $(u_n)$  est une suite arithmétique, alors

$$u_p + u_{p+1} + \dots + u_q = \frac{(u_p + u_q)(q-p+1)}{2}$$

$q-p+1$  est le nombre de termes de la somme

ex :  $S = \underbrace{8 + 10 + 12 + \dots + 36}_{\substack{18 \\ k=4}} = \sum_{k=4}^{18} 2k$

Il y a  $18-4+1 = 15$  termes

donc  $S = \frac{(8+36) \cdot 15}{2} = 22 \cdot 15 = 330$

### III Sums geometrice

def 1:  $\{l_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  est géométrique si  $\exists r \in \mathbb{R} / \forall n \in \mathbb{N}$

$$l_{n+1} = l_n \times r$$

/ ration

def 2:  $\{l_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  est géométrique  $\Leftrightarrow \exists r \in \mathbb{R} / \forall n \in \mathbb{N}$

$$l_n = l_0 \times r^n$$

$$1 + r + \dots + r^{n-1} = \frac{r^n - 1}{r - 1} = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$$
       $r \neq 1$   
 $n+1$        $r = 1$

ex 1 Calculer  $S = 2^8 + 2^9 + \dots + 2^{17}$

$$S = 2^8(1 + 2 + \dots + 2^9) = 2^8 \frac{2^{10} - 1}{2 - 1} = \underline{\underline{2^{18} - 2^8}}$$

ex2: Calculate  $\cos(5x) + \cos(6x) + \cos(7x) + \dots + \cos(34x) = C$

$$\cos \theta = \operatorname{Re}(e^{i\theta})$$

$$\begin{aligned} \text{then } C &= \operatorname{Re} \left( e^{i5x} + e^{i6x} + \dots + e^{i34x} \right) \\ &= \operatorname{Re} \left( (e^{ix})^5 + (e^{ix})^6 + \dots + (e^{ix})^{34} \right) \\ &= \operatorname{Re} \left( e^{i5x} (1 + e^{ix} + e^{i2x} + \dots + e^{i29x}) \right) \\ &= \operatorname{Re} \left( e^{i5x} \frac{e^{i30x} - 1}{e^{ix} - 1} \right) = \operatorname{Re} \left( e^{i5x} \frac{e^{i15x} (e^{i15x} - e^{-i15x})}{e^{ix_2} / e^{ix_2} - e^{-ix_2}} \right) \\ &= \operatorname{Re} \left( e^{i19.5x} \frac{\cancel{e^{i5x}} \sin(15x)}{\cancel{e^{ix}} \sin x_2} \right) = \operatorname{Re} \left( \frac{\cos(19.5x) \sin(15x)}{\sin x_2} + i \frac{\sin(19.5x) \sin(15x)}{\sin x_2} \right) \\ C &\approx \frac{\cos(19.5x) \sin(15x)}{\sin x_2} \end{aligned}$$

## IV Suites adjacentes

def: deux suites dont adjacentes lorsque l'une est croissante,  
l'autre est décroissante et la différence des deux tend vers 0.

$$\left. \begin{array}{l} (\ell_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est croissante} \\ (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est décroissante} \\ \ell_n - v_n \rightarrow 0 \end{array} \right\}$$

D

Deux suites adjacentes convergent (vers la même limite)

$$\text{ex: } l_0 = 1 ; v_0 = 37 \quad u_{n+1} = \sqrt{l_n v_n} , \forall n \in \mathbb{N}$$

et

$$v_{n+1} = \frac{l_n + v_n}{2} , \forall n \in \mathbb{N}$$

rgo:  $\forall n \in \mathbb{N}, l_n > 0$  et  $v_n > 0$

$$v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{l_n + v_n}{2} - \sqrt{u_n v_n} = \frac{l_n - 2\sqrt{u_n v_n} + v_n}{2} = \frac{(\sqrt{u_n} - \sqrt{v_n})^2}{2} > 0$$

donc  $\forall n \in \mathbb{N}$

$$l_n \leq v_n$$

$$v_{n+1} - v_n = \frac{l_n + v_n}{2} - v_n = \frac{l_n + v_n - 2v_n}{2} = \frac{l_n - v_n}{2} \leq 0$$

donc  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante

$$\frac{l_{n+1}}{u_n} = \frac{\sqrt{u_n v_n}}{u_n} = \sqrt{\frac{v_n}{u_n}} \geq \sqrt{1} = 1 \quad \left( \frac{l_n}{u_n} > 1 \text{ car } l_n \leq v_n \right)$$

$\Rightarrow (l_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est croissant

$U_n, M_n \leq V_n$  et  $(V_n)$  est décroissante, donc  $V_n \leq V_0 = 37$   
 $\Rightarrow U_n, M_n \leq 37$

La suite  $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante et majorée, donc elle CV.  
On appelle  $v$  sa limite

$$V_n \geq M_n \geq M_0 = 1 \quad (V_n) \text{ est minorée (par 1)}$$

$(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante et minorée, donc elle CV. On appelle  $v$  sa limite

$$V_{n+1} = \frac{U_n + V_n}{2}. \quad n \rightarrow +\infty \quad \text{On obtient} \quad v = \frac{u+v}{2}$$

$$\Rightarrow w = u + v \Rightarrow v = u$$

$$M_n - V_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} u - v = 0$$

$(U_n)$  est croissante  
 $(V_n)$  est décroissante

$\left. \right) \Rightarrow$  les suites sont adjacentes

V Suites de type  $aM_{n+2} + bM_{n+1} + cM_n = 0$

T  $P(x) = ax^2 + bx + c$  est le polynôme caractéristique associé.

Si  $\Delta > 0$ : 2 racines  $\alpha$  et  $\beta$ .

$$M_n = A\alpha^n + B\beta^n$$

(rappel:  $(\alpha^n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(\beta^n)_{n \in \mathbb{N}}$  sont géométriques)

$$A \text{ et } B \in \mathbb{R}$$

Si  $\Delta = 0$  1 racine double  $\alpha$

$$M_n = (An + B)\alpha^n$$

Si  $\Delta < 0$  2 racines  $\Re e^{\pm i\theta}$

$$M_n = r^n (A \cos(n\theta) + B \sin(n\theta))$$

$$\text{ex 1 : } u_{n+1} = u_n + 2u_{n-1}, \quad \forall n > 0 \quad \text{et } u_0 = 37 \text{ et } u_1 = -1$$

Trouver  $u_n$  :

$$u_{n+1} = u_n + 2u_{n-1}, \quad \forall n > 0 \Leftrightarrow u_{n+2} = u_{n+1} + 2u_n, \quad \forall n > 0$$

(pour  $n=1$  :

$$u_2 = u_1 + 2u_0$$

$$\text{pour } n=0 \\ u_2 = u_1 + 2u_0$$

$$\Leftrightarrow u_{n+2} - u_{n+1} - 2u_n = 0$$

$$P(x) = x^2 - x - 2 \quad \Delta = 9$$

$$\text{2 racines : } \frac{1 \pm 3}{2} = \begin{cases} 2 \\ -1 \end{cases} \Rightarrow u_n = A2^n + B(-1)^n$$

$$\begin{cases} u_0 = 37 = A + B \\ u_1 = -1 = 2A - B \end{cases} \quad \begin{aligned} l_1 + l_2 : \quad 3A = 36 &\Rightarrow A = 12 \\ l_1 : \quad B = 37 - A &= 37 - 12 = 25 \end{aligned}$$

$$u_n = 12 \cdot 2^n + 25(-1)^n$$

$$z_1 = 1 - i$$

$$|z_1| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$



$$z_1 = \sqrt{2} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} - i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{2} \left( \frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

$$(z_1)^7 = \left( \sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}} \right)^7 = \left( 2^{\frac{1}{2}} \right)^7 e^{-i\frac{7\pi}{4}}$$
$$= 2^{\frac{7}{2}} e^{-i\frac{7\pi}{4} + i2\pi}$$

$$= \cancel{2^{\frac{3}{2}} e^{i\frac{\pi}{4}}} = 8\sqrt{2} \left( \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$= 8(1+i) = 8+8i$$

$$\cancel{8\sqrt{2} e^{i\frac{7\pi}{4}}}$$