


①  $\cos(2x)$  de deux façons +  $\cos(\theta x) \cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$

② déf de la matrice de  $f$  dans la base  $B'$

③ DL de  $\ln(1-x)$  à l'ordre n  $\ln(1-x) = x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^n}{n} + O(x^n)$

④ déf de la matrice du passage de  $B$  à  $B'$



⑤ dérivées de  $\tan(x)$   $\tan'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x > 0$

$$\text{Mat}_{B'}(f) = \begin{pmatrix} \text{Coord de } f(\vec{v}_1) & \text{Coord de } f(\vec{v}_2) & \text{Coord de } f(\vec{v}_3) \\ \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \vec{v}_3 \end{pmatrix} \text{ où } B' = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$$

$$\underline{\text{Mat}}_{B \rightarrow B'}(f) = \begin{pmatrix} \text{Coord de } f(\vec{v}) \\ \text{Coord de } f(\vec{w}) \\ \text{Coord de } f(\vec{\omega}) \end{pmatrix} \text{ où } B' = (\vec{v}, \vec{w}, \vec{\omega})$$

$$\sum_{k=1}^n k = 1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\underbrace{\sum_{k=2}^{n+1} (k-1)}_{=1+2+3+\dots+n} = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=2}^{n+1} k-1 = 2+3+\dots+n+(n+1)-1 \\ = \underbrace{1+2+\dots+n}_{=1+2+\dots+n} + (n+1)-2 = \frac{n(n+1)}{2} + n-1 = \frac{n^2+n+2n-2}{2} = \frac{n^2+3n-2}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n 1 = \underbrace{1+1+\dots+1}_{n \text{ fois}} = n$$

$$\sum_{k=2}^{n+1} k = \underbrace{2+3+\dots+n+(n+1)}_{=n+(n+1)+\dots+n+(n+1)} \\ = \frac{n(n+1)}{2} + n = \frac{n^2+n+2n}{2} = \frac{n^2+3n}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n n = \underbrace{n+n+\dots+n}_{n \text{ fois}} = n^2$$

$$\sum_{k=p}^q k = \frac{(q-p+1) \cdot (p+q)}{2} = \cancel{pq+q^2-pq-p^2+pq}$$

$$\sum_{p}^q k = \cancel{p+p+1+\dots+p+q} - \cancel{(q+1)p+1+2+\dots+q} = \cancel{(q+1)p} + \cancel{\frac{q(q+1)}{2}}$$

$$= p+(p+1)+\dots+q = (1+2+\dots+q) - (1+2+\dots+(p-1))$$

$$= \frac{q(q+1)}{2} - \frac{(p-1)p}{2} = \frac{q^2+q-p^2+p}{2}$$

$$\sum_{k=3}^{n+3} r^k = r^3 + r^4 + \dots + r^{n+3}$$

$$= r^3 [1 + r + r^2 + \dots + r^n] = r^3 \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1} \quad \text{qd } r \neq 1$$

$$= \cancel{r^3} \cdot (n+1) \quad \text{qd } r = 1$$

$$13 + 15 + 17 + \dots + 43 = \sum_{k=6}^{21} (2k+1) = 2 \sum_{k=6}^{21} k + \sum_{k=6}^{21} 1$$

$$= \cancel{2} \cdot \frac{(21+6) \cdot (21-6+1)}{\cancel{2}} + 21-6+1$$

$$= 27 \cdot 16 + 16 = 16 \cdot 28 = 448$$

$$\frac{28}{16} \quad 4$$

$$\frac{16}{448}$$

$$13 + 15 + 17 + \dots + 43 = \sum_{k=4}^{14} (3k+1) = 3 \sum_{k=4}^{14} k + \sum_{k=4}^{14} 1 = 3 \frac{(4+14) \cdot (14-4+1)}{2} + 14-4+1$$

$$= 3 \times \frac{18 \cdot 11}{2} + 11 = 27 \times 11 + 11 = 28 \times 11 = 308$$

ex1: Calcul de  $Q(x) = \begin{vmatrix} -x & a & a \\ a-x & a & a \\ a & a & -x \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 2a-x & 2a-x & 2a-x \\ a & -x & a \\ a & a & -x \end{vmatrix} |L_1+L_2+L_3$

$$P(x) = \begin{vmatrix} 2a-x & 0 & 0 \\ a & -x-a & 0 \\ a & 0 & -x-a \end{vmatrix} \stackrel{\text{d'ap/}}{=} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (-x-a) \\ a & -x-a & 0 \end{vmatrix}$$

$$C_1 \quad C_2-C_1 \quad C_3-C_1$$

$$P(x) = (-x-a)(2a-x)(-x-a) = (-x-a)^2(2a-x) = (x+a)^2(2a-x)$$

La deux racines:  $-a$ , de multiplicité 2

$2a$ , racine simple

ex2:  $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{vmatrix} \stackrel{\text{d'ap/}}{=} 1 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} - 0 + 0 = 24$



$$\begin{vmatrix} a_1 & 0 & \dots & 0 \\ * & a_2 & \ddots & \vdots \\ * & * & \ddots & 0 \\ * & * & \ddots & a_n \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n a_i$$

le déterminant d'une matrice diagonale ou triangulaire est le produit des termes de la diagonale

ex3

$$\mathbb{D}_n = \begin{vmatrix} 5 & -\sqrt{6} & 0 & \cdots & 0 \\ -\sqrt{6} & 5 & -\sqrt{6} & \cdots & 0 \\ 0 & -\sqrt{6} & 5 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & -\sqrt{6} & 5 \end{vmatrix}$$

*n lignes et n colonnes*

$$\xrightarrow{\text{dopt/}\text{L}_1} = 5 \begin{vmatrix} 5 & -\sqrt{6} & 0 & \cdots & 0 \\ -\sqrt{6} & 5 & -\sqrt{6} & \cdots & 0 \\ 0 & -\sqrt{6} & 5 & \cdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -\sqrt{6} \\ 0 & 0 & 0 & -\sqrt{6} & 5 \end{vmatrix} \leftarrow \mathbb{D}_{n-1}$$

*n-1 lignes et n-1 colonnes*

$$+ \sqrt{6} \begin{vmatrix} -\sqrt{6} & -\sqrt{6} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 5 & \cdots & & 0 \\ 0 & -\sqrt{6} & 5 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \sqrt{6} \\ 0 & 0 & -\sqrt{6} & 5 & \cdots \end{vmatrix} + 0 \dots + 0$$

*n-1 lignes et n-1 col.*

$$\xrightarrow{\text{dopt/ Col 1}} \mathbb{D}_n = 5 \mathbb{D}_{n-1} + \sqrt{6} \times (-\sqrt{6}) \begin{vmatrix} 5 & -\sqrt{6} & 0 & \cdots & 0 \\ -\sqrt{6} & 5 & -\sqrt{6} & \cdots & \sqrt{6} \\ 0 & -\sqrt{6} & 5 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \leftarrow \mathbb{D}_{n-2}$$

*n-2 lignes et colonnes*

$\boxed{\mathbb{D}_n = 5 \mathbb{D}_{n-1} - 6 \mathbb{D}_{n-2}}$

$$D_n - 5D_{n-1} + 6D_{n-2} = 0$$

$$P(x) = x^2 - 5x + 6 \quad \Delta = 25 - 24 = 1$$

receives  $\frac{5 \pm 1}{2} = \begin{cases} 3 \\ 2 \end{cases}$

$$\underline{D_n = A2^n + B3^n}$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 5 & -\sqrt{6} \\ -\sqrt{6} & 5 \end{vmatrix} = 25 - 6 = 19$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 5-\sqrt{6} & 0 \\ -\sqrt{6} & 5-\sqrt{6} \\ 0 & -\sqrt{6} \end{vmatrix} \stackrel{\text{det}}{=} 5 \begin{vmatrix} 5-\sqrt{6} & 0 \\ -\sqrt{6} & 5 \end{vmatrix} + \sqrt{6} \begin{vmatrix} -\sqrt{6} & -\sqrt{6} \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = 5 \cdot 19 + \sqrt{6} \cdot -\sqrt{6} \cdot 5 \\ = 5 \cdot 19 - 6 \cdot 5 \\ = 5(19-6) = 5 \cdot 13 = 65$$

$$D_2 = \begin{cases} 4A + 9B = 19 \end{cases}$$

$$D_3 \begin{cases} 8A + 27B = 65 \end{cases}$$

$$L_2 - 2L_1: 9B = 65 - 38 = 27 \Rightarrow B = 3$$

$$\Rightarrow L_1 \quad 4A = 19 - 27 = -8 \Rightarrow A = -2$$

$$D_n = 3 \cdot 3^n - 2 \cdot 2^n$$

$$\boxed{D_n = 3^{n+1} - 2^{n+1}}$$

propriétés:  $\det(aA) = a^n \cdot \det A$  où  $n$  est la taille de  $A$

$$\det(\epsilon A) = \det(A)$$

$$\det(I_n) = 1$$

$$\boxed{\det(AB) = \det(A) \det(B)}$$

$$\det(Q^{-1}) = \frac{1}{\det(Q)}$$

$Q$  est inversible  $\Leftrightarrow \det(Q) \neq 0$

$$\left[ \begin{array}{l} Q \cdot Q^{-1} = I_n \\ \det(Q \cdot Q^{-1}) = \det(I_n) = 1 \\ \det(Q) \cdot \det(Q^{-1}) = 1 \Rightarrow \det(Q^{-1}) = \frac{1}{\det(Q)} \end{array} \right]$$

$$\underline{\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix} = \det(A) \cdot \det(C)} \quad / \text{ex: } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \cdot 7$$

determinant par bloc

S'il on change de base, le déterminant ne change pas

$$[ A' = \varrho^{-1} A \varrho \text{ où } A = \text{Mat}_{\mathbb{R}}(B) ; A' = \text{Mat}_{\mathbb{R}}(B') ]$$

et  $\varrho$  est la matrice de passage de  $B \simeq B'$

$$\begin{aligned} \det(A') &= \det(\varrho^{-1} A \varrho) = \det(\varrho^{-1}) \det(A) \det(\varrho) \\ &= \frac{1}{\det(\varrho)} \det(\det \cancel{\det(\varrho)}) \quad ] \end{aligned}$$

$\det_{\mathbb{R}}(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n) = 0 \Leftrightarrow$  la famille  $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$  est liée

$\mathbb{B} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$  est une base de  $\mathbb{R}^n \Leftrightarrow \det(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n) \neq 0$

Def: le déterminant d'un endomorphisme  $f$  de  $\mathbb{R}^n$  est

$$\underline{\det(f)} = \det(\text{Mat}_{\mathbb{R}}(f)) \text{ où } \mathbb{B} \text{ est une base de } \mathbb{R}^n$$

proprieté: Si  $f \in L(\mathbb{R}^n)$

Rappel:  $f$  est bijective  $\Leftrightarrow \text{Mat}_B(f)$  est inversible



$f$  est bijective  $\Leftrightarrow \det(f) \neq 0$

$$\det(f^{-1}) = \frac{1}{\det(f)}$$

$$\det(f \circ g) = \det(f) \cdot \det(g) \quad [ \det(f \circ g) = \det(\text{Mat}_B(f \circ g)) ]$$

$$\text{et } \text{Mat}_B(f \circ g) = \text{Mat}_B(f) \cdot \text{Mat}_B(g) \quad \Rightarrow \quad \det(f \circ g) = \det(f) \cdot \det(g) \quad ]$$

$$\det(\text{Id}_{\mathbb{R}^n}) = 1$$

## II Inverse d'une matrice avec le déterminant

Rappel : le mineur relatif à  $a_{ij}$  est le déterminant  $\Delta_{i,j}$  obtenu en supprimant la ligne  $i$  et la colonne  $j$

def : le cofacteur de  $a_{ij}$  est  $(-1)^{i+j} \Delta_{i,j}$

def : la comatrice de A est la matrice contenant les cofacteurs

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot {}^t \text{COM}(A)$$

$$\text{ex: } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{COM}(A) = \begin{pmatrix} +4 & -2 \\ -3 & +1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} {}^t \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{ok inconsistent}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{COM}(B) = \begin{pmatrix} +|01| & -|10| & +|10| \\ -|10| & +|01| & -|01| \\ +|01| & -|10| & +|10| \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 + 1 = 2$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} {}^t \text{COM}(A) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$