

### III La théorie

def.: Un polynôme est scindé si on peut le factoriser en produit de polynômes de degré 1

ex:  $P(x) = (x-1)^2(x+3)$  est scindé

$$P(x) = x^2 + 1 \quad \begin{array}{|l} \text{n'est pas scindé dans } \mathbb{R}[x] \\ \text{est scindé dans } \mathbb{C}[x] \quad (x^2 + 1 = (x+i)(x-i)) \end{array}$$

Rappel: la matrice  $A$  est diagonalisable lorsque il existe  $\mathcal{Q}$  inversible telle que  $A' = \mathcal{Q}^{-1}A\mathcal{Q}$  est diagonale

def.: la matrice  $A$  est triangulaire lorsque il existe  $\mathcal{Q}$  inversible telle que  $A' = \mathcal{Q}^{-1}A\mathcal{Q}$  est triangulaire

T<sub>1</sub>  $A$  est trigonalisable  $\Leftrightarrow$  son polynôme caractéristique est scindé

les polynômes de  $\mathbb{C}[\lambda]$  sont tous scindés, donc on peut toujours trigonaliser dans  $\mathbb{C}$

T<sub>2</sub> Si le polynôme caractéristique de  $A$  est scindé à racines simples, alors  $A$  est diagonalisable

T<sub>3</sub>  $A$  est diagonalisable  $\Leftrightarrow$  le poly caract de  $A$  est scindé et la dimension de chaque espace propre est égale à la multiplicité de la valeur propre correspondante

exemple : Si  $P(x) = (2-x)^2(3-x)$

Il y a 2 espaces propres  $E_2 = \{\vec{u} / f(\vec{u}) = 2\vec{u}\}$   $\dim(E_2) = 1$

$E_3 = \{\vec{v} / f(\vec{v}) = 3\vec{v}\}$   $\dim(E_3) = 1 \text{ ou } 2$

pas diagonalisable

14 Si  $a$  est une valeur propre de  $A$ ,

$1 \leq \dim(E_a) \leq \text{mult}(a)$  diagonable

Multiplicité de  $a$  dans le polynôme caractéristique de  $A$

ex. Si  $P(x) = (2-x)^3(5-x)^2$ , alors  $\dim(E_2) = 1 \text{ ou } 2 \text{ ou } 3$

et  $\dim(E_5) = 1 \text{ ou } 2$  diagonable

15 dans  $M_n(R)$ , le poly caract commence par  $(-1)^n x^n$

ex:  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$   $B = (\vec{i}, \vec{j})$  est la base canonique de  $\mathbb{R}^2$   
 $f$  est l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^2$  tel que  $\text{Mat}_B(f) = A$

Trouver toutes les suites vérifiant  $\begin{cases} a_{n+1} = a_n - b_n \\ b_{n+1} = 2a_n + 4b_n \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}$

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} = A \bigcup_n$$

$(\bigcup_n)$  est une suite géométrique de raison  $A$

donc  $\bigcup_n = A^n \bigcup_0 \quad \underline{\begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} a_0 \\ b_0 \end{pmatrix}}$

F.N

Mais que vaut  $A^n$ ?

On diagonalise:  $P(x) = \begin{vmatrix} 1-x & -1 \\ 2 & 4-x \end{vmatrix} = (1-x)(4-x) + 2 = x^2 - 5x + 6$

$\Delta = 1$  2 racines:  $\frac{5 \pm 1}{2} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$  2 valeurs propres 2 et 3