



① DL de $\sin x$ à l'ordre $2n+2$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \mathcal{O}(x^{2n+2})$$

$$② \binom{100}{2} = \frac{100!}{2! \cdot 98!} = \frac{2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 98 \cdot 99 \cdot 100}{2 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 98} = 99 \cdot 50 = 4950$$

$$③ \cos(2x) = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x \quad \left(\int \sin^2 x dx = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2}x - \frac{\sin(2x)}{2} + C \right)$$

$$④ \text{def de la matrice de passage de } \mathcal{B} \text{ à } \mathcal{E} \quad L_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{E}} = \begin{pmatrix} \text{carre} \\ \vec{u} & \vec{v} & \vec{w} \\ \text{dans} & \text{dans} & \text{dans} \\ \mathcal{B} & \mathcal{B} & \mathcal{B} \end{pmatrix} \text{ où } \mathcal{E} = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$$

⑤ dérivées de $\tan(x)$

$$\tan'(x) = 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

$$\frac{1}{1+2n} + \frac{1}{1-2n} = \frac{1-2n + 1+2n}{(1+2n)(1-2n)} = \frac{2}{1-4n^2}$$

$$\begin{array}{r} x^3 + y^3 + x^2y + xy^2 - 6x - 6y \\ - (x^3 + x^2y) \\ \hline y^3 + xy^2 - 6x - 6y \\ - (xy^2 + y^3) \\ \hline - 6x - 6y \\ - (-6x - 6y) \\ \hline 0 \end{array} \quad \left| \begin{array}{c} x+y \\ \hline x^2 + y^2 - 6 \end{array} \right.$$

The term $x^2 + y^2 - 6$ is circled in red.

$$a_p = \frac{2^{qp} p!}{(qp+1)!} x^{qp+1}$$

$$2(p+1) + 1 = 2p + 2 + 1 = 2p + 3$$

$$\frac{a_{p+1}}{a_p} = \frac{\frac{2^{2p+2}}{(p+1)!} x^{2p+3}}{\frac{2^p p!}{(p+1)!} x^{2p+1}} = \frac{2^2}{\frac{2^{2p}}{p!} x^{2p+1} \frac{(p+1)!}{(2p+3)!}}$$

$$= \frac{4 \cdot (p+1) x^2}{(2p+2)(2p+3)} = \frac{2 \cdot 2(p+1) x^2}{2(p+1)(2p+3)} = \frac{2x^2}{2p+3}$$

$$S = \sum_{p=0}^{10} \frac{1}{(q+1)^6} \quad T = \sum_{i=1}^{10} \frac{1}{i^6}$$

~~$\frac{1}{k} = \frac{1}{n^6}$~~

$$S = \frac{\pi^6}{960} \quad T = \frac{1}{16}T + S \Rightarrow T - \frac{1}{16}T = S$$

$$\Rightarrow \frac{15}{16}T = \frac{\pi^6}{960} \Rightarrow T = \frac{\pi^6}{960} \times \frac{16}{15} = \frac{\pi^6}{900}$$

$$\begin{array}{r} 960 \\ 96 \quad | \frac{16}{60} \\ \times \frac{15}{60} \\ \hline 0000 \end{array}$$

$$F(t) = \frac{e^t + e^{-t}}{e-1} + e^{-t} \quad F(0) = \frac{1+1}{e-1} + 1 = \frac{2+e-1}{e-1} = \frac{e+1}{e-1}$$

$$F(1) = \frac{e^1 + e^{-1}}{e-1} + e^{-1} \quad e^{-1} = \frac{1}{e}$$

$$= \frac{e + \frac{1}{e}}{e-1} \times e + \frac{1}{e} = \frac{e^2 + 1}{(e-1)e} + \frac{1}{e} = \frac{e^2 + 1 + e-1}{(e-1)e} = \frac{e^2 + e}{(e-1)e} = \frac{e(e+1)}{(e-1)e}$$

(25) Dans l'ensemble des fonctions de \mathbb{R} dans \mathbb{R}

ex: Montrer que les fonctions $f/x \mapsto \cos x$; $g/x \mapsto \sin x$; $h/x \mapsto \sin(2x)$ forment une famille libre

Si $af + bg + ch = 0$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$)

on doit montrer que a, b, c sont nuls.

$$a \cos x + b \sin x + c \sin(2x) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

pour $x = 0$:

$$\underline{a=0}$$

pour $x = \frac{\pi}{2}$

$$\underline{b=0}$$

$$\Rightarrow c \sin(0x) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\text{pour } x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \underline{c=0}$$

$$\underline{a=b=c=0}$$

Donc la famille (f, g, h) est libre

III Applications Linéaires

ex1 : Montrer que $f: R_3[X] \rightarrow R_2[X]$ est linéaire. Noyau et image?

(rappel : $R_3[X] = \{ \text{polynômes de degré} \leq 3 \}$) $\dim(R_3[X]) = 4$

Soit φ et ψ des polynômes de $R_3[X]$. Soit a et $b \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f(a\varphi + b\psi) &= (a\varphi + b\psi)' = a\varphi' + b\psi' \\ &= a f(\varphi) + b f(\psi) \end{aligned}$$

donc f est linéaire

$$\varphi \in \ker(f) \Leftrightarrow f(\varphi) = 0 \Leftrightarrow \varphi' = 0 \Leftrightarrow \varphi = \text{cte}$$

$$\ker(f) = \text{Vect}(1) \quad \dim(\ker(f)) = 1$$

Théorème : $\dim(\ker(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(R_3[X]) = 4$

$\dim(\text{Im}(f)) = 3$
 $\text{Im}(f)$ est un sous-espace de $R_2[x]$

$$\text{Im}(f) = R_2[x]$$

car $\dim(R_2[x]) = 3$

Ex2: $f : R_2[x] \rightarrow R_2[x]$
 $P(x) \mapsto Q(x+1)$ (par exemple:
 $f(x^2 + 3x - 2) = (x+1)^2 + 3(x+1) - 2$
 $= x^2 + 5x + 2$)

Montrer que f est linéaire. Donner son noyau et son image

On prends 2 polynômes P et $Q \in R_2[x]$ et 2 réels a et b

$$f(aP + bQ)(x) = aP(x+1) + bQ(x+1) = af(P) + bf(Q).$$

f est linéaire. C'est un endomorphisme de $R_2[x]$

$$\begin{aligned} P \in \text{Ker}(f) &\Leftrightarrow f(P) = 0 \Leftrightarrow P(x+1) = 0 \Leftrightarrow a(x+1)^2 + b(x+1) + c = 0 \\ &\Rightarrow ax^2 + (2a+b)x + a+b+c = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} a=0 \\ ab=0 \\ a+b+c=0 \end{cases} \Rightarrow a=b=c=0 \quad \text{Ker } f = \{0\}$$

$$\text{et } \text{Im } f = R_2[x]$$

Quelle est la matrice dans la base canonique de $R_2[x]$?

$$B = (1, x, x^2)$$

$$\text{Mat}_{\mathbb{R}}(f) = \begin{pmatrix} f(1) & f(x) & f(x^2) \\ 1 & x & x^2 \\ B & B & B \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} f(1) &= 1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ f(x) &= x+1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$f(x^2) = (x+1)^2 = x^2 + 2x + 1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}_B$$

$$\text{Mat}_B(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\text{ex 3}}: \quad f \quad \left| \begin{array}{c} \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \\ A \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} A \end{array} \right.$$

*It ist eine
lineare*

Ie seien 2 Matrizen A und $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ und 2 reelle a und $b \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f(aA+bB) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}(aA+bB) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}aA + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}bB \\ &= a\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}A + b\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}B \\ &= a f(A) + b f(B) \end{aligned}$$

dann f ist linear

$$\underline{\text{Neyen def}}: A \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow f(A)=0 \qquad A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

$$f(A)=0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a+4b=0 \\ 2a+3b=0 \\ c+4d=0 \\ 2c+3d=0 \end{cases} \quad \begin{aligned} &2L_1 - L_2 : 5b=0 \quad b=0 \quad a=0 \\ &c=d=0 \end{aligned}$$

$\text{Ker}(f) = \{0\}$

$$\dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(M_2(\mathbb{R}))$$

0 ↗

$$\left. \begin{array}{l} \dim(\text{Im}(f)) = 1 \\ \text{Im}(f) \text{ est un sous-}M_2(\mathbb{R}) \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Im}(f) = M_2(\mathbb{R})$$

ex4: $f: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$
 $\quad g \mapsto (g(0), g(\pi))$ où \mathcal{F} désigne l'ensemble des fonctions de \mathbb{R}
 dans \mathbb{R}

① Montrer que f est linéaire ② Trouver une fonction f qui est dans le noyau de f non nulle

① Je prends 2 fonctions g et h et 2 réels a et b

$$\begin{aligned} f(ag+bh) &= ((ag+bh)(0), (ag+bh)(\pi)) = (ag(0)+bh(0), ag(\pi)+bh(\pi)) \\ &= (ag(0), ag(\pi)) + (bh(0), bh(\pi)) = a(g(0), g(\pi)) + b(h(0), h(\pi)) \\ &= af(g) + bf(h). \text{ Donc } \underline{\text{fonction linéaire}} \end{aligned}$$

② $f(\sin) = (\sin(0), \sin(\pi)) = (0, 0)$ $\sin \in \text{Ker}(f)$