

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

① $\det(A - x\mathbb{I}_3) = \begin{vmatrix} 1-x & \cdots & \cdots \end{vmatrix} = (1-x)^3$

② Il est facile de voir que 1, est une racine simple de multiplicité 3

③ Si A est diagonalisable : on a B' dans lequel $A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
= Mat_{B'}(Id)
= Mat_B(Id) = A

contradiction.

Donc A n'est pas diagonalisable

On peut calculer $E_1 = \left\{ \vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 / f(\vec{u}) = 1 \text{ et } \vec{u} \neq 0 \right\}$.

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 2y + z = 3 \\ -x - y + z = 3 \\ x + 2y + 2z = 3 \end{cases} \begin{array}{l} x + 2y + z = 0 \\ -x - y + z = 0 \\ x + 2y + 3 = 0 \end{array}$$

$$\Leftrightarrow x + 2y + z = 0.$$

La dimension de l'espace propre pour le vecteur propre 1 est 2

Elle est \neq à 3, donc A n'est pas diagonalisable.

Le poly caract est sauf, donc A est diagonalisable.

$$f(e_1) = e_1 - e_2 + e_3$$

$$B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$$

$$\text{Mat}(f) = \begin{pmatrix} f(e_1) \\ f(e_2) \\ f(e_3) \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{5} \quad \left(\begin{array}{ccc} 2 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc} 2 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \end{array} \right) \quad \text{pas de colonnes de } 0, \text{ alors}$$

$f(e_1) \quad f(e_2) \quad f(e_3) \quad \text{rang}(A) = 3$

$$\dim(\overline{\text{Im}(f)}) = 3 \Rightarrow \dim(\ker(f)) = 0 \quad (\text{T du rang})$$

f est surjective

$$\ker(f) = \{ \vec{0} \}$$

f est injective

$$\textcircled{7} \quad e'_1 = (1, 0, -1) \quad e'_2 = (1, -1, 1) \quad \text{H que } (e'_1, e'_2) \text{ est une base de}$$

$$F = \{ \vec{u} / f(\vec{u}) = \vec{u} \}$$

F est le plan d'éq $x+2y+z=0$

$$1+2\cdot 0 - 1 = 0 \quad \text{et} \quad 1+2\cdot(-1)+1 = 0$$

e'_1 et e'_2 sont 2 vecteurs
tels que du plan F .
C'est une base de F

$$\textcircled{2} \quad B' = (e'_1; e'_2; e_1) \quad e_1 = (1, 0, 0) \quad e'_1 = (1, -1, 1)$$

$$M_{\text{att}}(f, B') = \begin{pmatrix} f(e'_1) & f(e'_2) & f(e_1) \\ \downarrow s_1 & \downarrow s_2 & \downarrow s_3 \\ B'_1 & B'_2 & B'_3 \end{pmatrix} \quad f(e_1) = e'_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{B'},$$

$$f(e_2) = e'_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{B'}.$$

$$f(e) = 2e_1 - e_2 + e_3 = \cancel{e_1} + e_2' + \cancel{e_3}$$

$$= a e_1' + b e_2' + c e_3$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a+b+c = 2 \\ -b = -1 \\ -a+b = 1 \end{cases}$$

\uparrow
 $b(e_1)$

$b=1$ et $a=0$

$$f_{Q_1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}_{Q_1}, \quad | A' = Mat_B^A(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} |$$

$$A^2 = 2A - I$$

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{array}{|ccc|} \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array} = \begin{pmatrix} 2+2+2+(-1)+1+1 \\ 2+2+2+(-1)+1+1 \\ 2+2+2+(-1)+1+1 \end{pmatrix}$$

ça marche.

$$\boxed{A^2 = 2A - I}$$

② Montrons que A est inversible et que $A^{-1} = 2I - A$

$$(2I - A) \cdot A = 2IA - A^2 = 2A - (2A - I) = I$$

donc A est inversible et $A^{-1} = 2I - A$

$$\begin{aligned} \text{Si } \alpha I + \beta A = \alpha' I + \beta' A \\ \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \alpha' \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \beta' \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \alpha + 2\beta & \alpha + 2\beta & \alpha + 1 \\ -\beta & \beta & -\beta \\ \beta & 2\beta & 2\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha' & \alpha' & \alpha' \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow \begin{cases} \alpha + 2\beta = \alpha' + 2\beta' \\ -\beta = -\beta' \\ \beta = \beta' \end{cases} \Rightarrow \alpha = \alpha' \quad \text{fin} \end{aligned}$$

$$\alpha = \alpha' \text{ et } \beta = \beta'$$

$$X_{n+1} = \frac{X_n^2}{n+1} + 2\mathbb{I} - A \quad \text{et } X_0 = A$$

(4) $X_n = \alpha_n \mathbb{I} + \beta_n A$ par récurrence

(i) pour $n=0$ $X_0 = 0 \cdot \mathbb{I} + 1A$ OK

(ii) Supposons $n \geq 0$. Je veux prouver $X_n = \alpha_n \mathbb{I} + \beta_n A$

$$X_{n+1} = \frac{(\alpha_n \mathbb{I} + \beta_n A)^2}{n+1} + 2\mathbb{I} - A = \frac{\alpha_n^2 \mathbb{I}^2 + 2\alpha_n \beta_n \mathbb{I} \cdot A + \beta_n^2 A^2}{n+1} + 2\mathbb{I} - A$$

$$X_{n+1} = \frac{\alpha_n^2 \mathbb{I} + 2\alpha_n \beta_n A + \beta_n^2 A^2 - \beta_n^2 \mathbb{I}}{n+1} + 2\mathbb{I} - A$$

$$= \left(\frac{\alpha_n^2 - \beta_n^2}{n+1} + 2 \right) \mathbb{I} + \left(\frac{2\alpha_n \beta_n + 2\beta_n^2}{n+1} - 1 \right) A$$

$$= \alpha_{n+1} \mathbb{I} + \beta_{n+1} A \quad \text{OK!}$$

Conclusion : . . .

Il semble que $\alpha_n = n$ et $\beta_n = 1$ par récurrence
 On voit que $\alpha_{n+1} = \frac{\alpha_n^2 - \beta_n^2}{n+1} + 2$ et $\beta_{n+1} = \frac{2\beta_n(\alpha_n + \beta_n)}{n+1} - 1$

(i) pour $n=0$ $\alpha_0=0$ et $\beta_0=1$ OK

(ii) Je prends $n \geq 0$. Je suppose que $\underline{\alpha_n = n}$ et $\underline{\beta_n = 1}$

$$\alpha_{n+1} = \frac{n^2 - 1}{n+1} + 2 = \frac{(n+1)(n-1)}{n+1} + 2 = n-1+2 = n+1$$

$$\underline{\alpha_{n+1} = n+1}$$

$$\beta_{n+1} = \frac{2 \cdot 1 (n+1)}{n+1} - 1 = 2 - 1 = 1$$

$$\underline{\beta_{n+1} = 1}$$

Conclusion :

SERIES DE NOMBRES (Rels ou complexes)

I Séries de Riemann

def: $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^N u_n$ ($= u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_N + \dots$)

↑
c'est ça qu'on appelle une série

(Une série, c'est la somme de tous les termes d'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$)

ex1: $\sum_{n=0}^{+\infty} 1 = +\infty$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^N \left(\frac{1}{2}\right)^n = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{N+1}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{2}{2-1}$$

\Rightarrow

On dit que $\sum_{n=0}^{+\infty} 1 \rightarrow \infty$ et que $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} \rightarrow 2$

Def.: La série $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ converge (CV) lorsque $\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_0^N u_n$ existe et est finie
 Sinon, elle Diverge (Div)

F1


$$\forall x \in]-1, 1[\quad \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

Rappel: Somme partielle d'une suite géométrique:
 $1+x+x^2+\dots+x^N = \sum_{n=0}^N x^n = \frac{1-x^{N+1}}{1-x}$ et comme $x \in]-1, 1[$, $x^{N+1} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$

T de comparaison Série - Intégrales Généralisées:

Si $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ est

positive	, alors $\sum_{n=0}^{+\infty} f(n)$ et $\int_0^{+\infty} f(t)dt$ ont	
	continue	même nature
		décroissante



$$f_{11} + f_{21} + f_{31} + \dots + f_{N1} \leq \int_0^N f(t) dt$$

Si $\sum_{n=0}^{+\infty} f(n) \text{ DiV}$, alors $\int_0^{+\infty} f(t) dt \text{ DiV}$ aire des rectangles aire sous la courbe

Si $\int_0^{+\infty} f(t) dt \text{ CV}$, alors $M_n = f(1) + f(2) + \dots + f(n)$ est une suite croissante et majorée, donc elle CV

$$\int_1^N f(t) dt \leq f_{11} + f_{21} + \dots + f_{(N-1)} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Si } \int_1^{+\infty} f(t) dt \text{ DiV, alors } \sum_n f(n) \text{ DiV} \\ \text{Si } \sum_n f(n) \text{ CV, alors } \int_1^{+\infty} f(t) dt \text{ CV} \end{array} \right.$$

Séries de Riemann :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} \quad \begin{cases} \text{CV qd } \alpha > 1 \\ \text{Div qd } \alpha \leq 1 \end{cases}$$

□ $f \mid [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ f est positive, décroissante et continue,
 $x \mapsto \frac{1}{x^\alpha}$ donc $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ et $\sum_1^{+\infty} f(n)$ ont la même nature

rappel : $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt$ $\begin{cases} \text{CV qd } \alpha > 1 \\ \text{Div qd } \alpha \leq 1 \end{cases}$]

⚠ Ne pas confondre $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{a^n}$

Séries de Riemann

séries géométriques

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

Sous de Fourier

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = 2$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \underbrace{\sum_{n=0}^N u_n}_{\text{somme partielle}} + \underbrace{\sum_{n=N+1}^{+\infty} u_n}_{\text{reste}}$$

II Critères de convergence

$\boxed{1} CV + CV = CV \quad \alpha \times CV = CV$

(l'ensemble des séries convergantes est un espace vectoriel)

ex: $\sum_1^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{1}{2^n} \right) CV$ car $\begin{cases} \sum_1^{\infty} \frac{1}{n^2} CV \text{ (Piemann, } \alpha=2>1) \\ \sum_1^{\infty} \frac{1}{2^n} CV \text{ (Série géométrique de raison } \frac{1}{2} \in]-1, 1[) \end{cases}$

$\boxed{2} CV + DiV = DiV$ ex: $\sum_1^{+\infty} \frac{1}{n} DiV$ (Piemann, $\alpha=1$) et $\sum_1^{+\infty} \frac{1}{2^n} CV$ dans $\sum_1^{+\infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{2^n} \right) DiV$