

ce est

④ $\Psi \begin{cases} R_2[x] \rightarrow R_3[x] \\ \varPhi(x) \mapsto x\varPhi'(x) - 2\varPhi(x) \end{cases}$ • Ψ va de $R_3[x]$ dans $R_3[x]$
 $(\deg(\varPhi') \leq 2 \Rightarrow \deg(x\varPhi' - 2\varPhi) \leq 3)$

- Soit \varPhi et $\varPsi \in R_3[x]$ et $(a, b) \in R^2$

$$\begin{aligned}\Psi(a\varPhi + b\varPsi)(x) &= x(a\varPhi + b\varPsi)' - 2(a\varPhi + b\varPsi) \\ &= x(a\varPhi' + b\varPsi') - 2a\varPhi - 2b\varPsi \\ &= a(x\varPhi' - 2\varPhi) + b(x\varPsi' - 2\varPsi) \\ &= a\Psi(\varPhi) + b\Psi(\varPsi)\end{aligned}$$

donc Ψ est linéaire

donc Ψ est un endomorphisme de $R_3[x]$

$$\varrho \in \ker(\psi) \Leftrightarrow \psi(\varrho) = 0 \Leftrightarrow x\varrho'(x) - 2\varrho(x) = 0$$


$$\varrho = Ae^{+\int \frac{2}{x} dx} = Ae^{2\ln(x)} = Ae^{\ln(x^2)} = Ax^2$$

$$\underline{\ker(\psi) = \{Ax^2 \text{ où } A \in \mathbb{R}\}} = \text{Vect}(x^2) \quad \dim(\ker(\psi)) = 1$$

ψ n'est pas injective car $\ker(\psi) \neq \{0\}$

$$\dim_{\text{1}}(\ker(\psi)) + \dim_{\text{3}}(\text{Im}(\psi)) = \dim(\mathbb{R}_3[x]) = 4$$

$$\underline{\text{rang}(\psi) = 3}$$



$$\psi(1) = x \cdot 0 - 2 \cdot 1 = -2$$

$$\psi(x) = x \cdot 1 - 2x = -x$$

$$\psi(x^2) = 0$$

$$\psi(x^3) = x \cdot 3x^2 - 2x^3 = x^3$$

$$\underline{\text{Im}(\psi) = \text{Vect}(-2; -x; x^3)}$$

base

3) $\text{DiV} + \text{DiV} ??$

ex $S_1 = \sum \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{2^n} \right) \text{ DiV}$ (exemple précédent)

$$S_2 = \sum \left(-\frac{1}{n} + \frac{1}{2^n} \right) \text{ DiV} \quad (\text{CV} + \text{DiV} = \text{DiV})$$

$$S_1 + S_2 = \sum 2 \cdot \frac{1}{2^n} \text{ CV} \quad (\text{Somme Géométrique de raison } \frac{1}{2})$$

4)

Si $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \text{ CV}$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$



Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \neq 0$, alors $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \text{ DiV}$

⚠ c'est faux dans
l'autre sens

ex: Quelle est la nature de la série de terme général $u_n = \sin(n)$?

u_n n'a pas de limite en $+\infty$, donc $\sum_{n=0}^{+\infty} \sin(n) \text{ DiV}$

ex: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ CV et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ DiV (series de Riemann)

or

$$\frac{1}{n^2} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

15) Théorème de comparaison.

Si $0 \leq a_n \leq b_n$ alors

$$\sum b_n \text{CV} \Rightarrow \sum a_n \text{CV}$$

$$\sum a_n \text{DiV} \Rightarrow \sum b_n \text{DiV}$$

16) T des équivalents

Si $0 \leq a_n \sim b_n$ alors $\sum a_n$ et $\sum b_n$ ont la même nature

Ex: $\frac{b_n}{a_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1$. Si on a assez grand ($n \geq N$), $\frac{1}{2} \leq \frac{b_n}{a_n} \leq 2 \Rightarrow \frac{1}{2}a_n \leq b_n \leq 2a_n$

Si $\sum_1^{+\infty} b_n \text{CV}$, alors $\sum_1^{+\infty} \frac{1}{2} a_n \text{CV}$ (T de comparaison)
 $\Rightarrow \sum_1^{+\infty} a_n \text{CV}$ (on multiplie par 2)

Si $\sum_1^{+\infty} b_n \text{DiV}$ alors $\sum_1^{+\infty} 2a_n \text{DiV}$ (T de comparaison)
 $\Rightarrow \sum_1^{+\infty} a_n \text{DiV}$

Si $\sum_1^{+\infty} a_n \text{CV}$ alors, $\sum 2a_n \text{CV}$
 $\Rightarrow \sum b_n \text{CV}$ (T de comparaison)

Si $\sum_1^{+\infty} a_n \text{DiV}$, alors $\sum \frac{1}{2} a_n \text{DiV}$
 $\Rightarrow \sum b_n \text{DiV}$ (T de comparaison)

]]

ex1: $u_n = \sin\left(\frac{1}{n^2}\right)$ Nature de $\sum u_n$?

$$\sin\left(\frac{1}{n^2}\right) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{n^2} \quad \text{car } \sin\left(\frac{1}{n^2}\right) = \frac{1}{n^2} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \text{ CV (Riemann: } \varepsilon > 1) \quad \text{car } \sum_{n=1}^{+\infty} u_n \text{ CV (T des N)}$$

ex2: $u_n = \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ Nature de la série $\sum u_n$?

$$\sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \text{ DV (Riemann: } \varepsilon < 1) \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} u_n \text{ DV (T des N)}$$

ex3: $u_n = \frac{2^n + 3^n}{5^n}$ Nature de $\sum u_n$?

$$u_n \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{3^n}{5^n} = \left(\frac{3}{5}\right)^n \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n \text{ CV (série géométrique de raison } \frac{3}{5} \in]-1, 1[)$$

$$\Rightarrow \sum u_n \text{ CV (T des N)}$$

Ex 4: $u_n = \frac{2^n + (-3)^n}{5^n}$ Nature de $\sum u_n$?

$$u_n \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{(-3)^n}{5^n} = \left(\frac{-3}{5}\right)^n.$$

$\sum \left(\frac{-3}{5}\right)^n CN$ (série géométrique de raison $-\frac{3}{5} \in]-1, 1[$)

donc $\sum u_n CN$ (~~T de N~~)

Ici, on ne peut pas utiliser le T de N car $\left(\frac{-3}{5}\right)^n$ change de signe.

On verra bientôt

Ex 5 $u_n = \frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} - \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$

$$u_n \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{2n^2} \quad \sum_1^{\infty} \frac{1}{n^2} CN \text{ (Riemann; } \varepsilon > 1 \text{)} \Rightarrow \sum_1^{\infty} \frac{1}{2n^2} CN$$

$$\Rightarrow \sum u_n CN \text{ (T de N)}$$

$$\underline{\text{ex6}} : u_n = \frac{\tan(\frac{1}{n}) - \sin(\frac{1}{n})}{1 - \cos(\frac{1}{n})} = \frac{\frac{1}{n} + \frac{1}{3n^3} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) - \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{6n^3} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)}{1 - \left(1 - \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)}$$

$$u_n = \frac{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right)\frac{1}{n^3} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)}{\frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)} = \frac{\frac{1}{2n^3} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)}{\frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)} \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{\frac{1}{2n^3}}{\frac{1}{2n^2}} = \frac{1}{n}$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \text{ DiV (Riemann)} \Rightarrow \underline{\sum u_n \text{ DiV (T de V)}}$$

7 Convergence Absolue

def: La série de terme général u_n converge absolument (CVA)

lorsque $\sum |u_n| < \infty$

I

CVA \Rightarrow CV

$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n < \infty$ (série géométrique de raison $\frac{2}{5} < 1$)

$$\underline{\text{ex4}} \quad u_n = \frac{2^n + (-3)^n}{5^n} \quad |u_n| \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \left|\left(\frac{-3}{5}\right)^n\right| = \left(\frac{3}{5}\right)^n \Rightarrow \sum |u_n| < \infty \text{ (T de V)}$$

$$\Rightarrow \underline{\sum u_n < \infty} \quad (\text{CVA} \Rightarrow \text{CV})$$

8 Règle de D'Alembert

Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l$ alors $\begin{cases} l < 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ CVA, donc CV} \\ l > 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ DiV} \\ l = 1 \Rightarrow \text{rien} \end{cases}$

• Si $l > 1$. $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1$ pour n assez grand ($n \geq N$)

$$\Rightarrow |a_{n+1}| > |a_n| > 0 \text{ pour } n \geq N$$

$\forall n > N : |a_n| > |a_N|$. Donc la suite $(a_n)_{n \geq N}$ ne tend pas vers 0

Donc $\sum_0^{+\infty} a_n$ DiV (critère n°4)

• Si $l < 1$ $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < \frac{l+1}{2}$ pour n assez grand ($n \geq N$)

pour $n \geq N$, tous les $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ sont ici



$$\forall n \geq N; 0 \leq \left| \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} \right| < r = \frac{1+\ell}{2} < 1$$

$$\Rightarrow \forall n \geq N \quad |\alpha_{n+1}| < r |\alpha_n|$$

$$\Rightarrow \left| \alpha_{N+p} \right| < r^p |\alpha_N|$$

$$\sum_{n=N}^{+\infty} |\alpha_n| < \sum_{p=0}^{+\infty} r^p |\alpha_N| = |\alpha_N| \sum_{p=0}^{+\infty} r^p$$

$$\sum_{p=0}^{+\infty} r^p < \infty \quad (\text{Serie Geometrique de raison } r \in]0, 1[)$$

$$\text{donc } \sum_{n=N}^{+\infty} |\alpha_n| < \infty \quad (\text{T décomposition})$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} |\alpha_n| < \infty \quad \Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n < \infty \quad (\text{CV} \rightarrow \text{CV}) \quad \square$$