

① Déf de la matrice de g dans la base \mathcal{B}

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(g) = \begin{pmatrix} \text{coeff de } g(\vec{v}_1) \\ \text{coeff de } g(\vec{v}_2) \\ \text{coeff de } g(\vec{v}_3) \end{pmatrix} \text{ où } \mathcal{B} = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$$


② DL de $\sin z$ à l'ordre 3

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \mathcal{O}(x^5)$$

③ DL de $\sin x$ à l'ordre 4

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \mathcal{O}(x^5)$$

④ Dessin de $\sin x$



⑤ $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a$

$$\textcircled{2} \quad U_{n+1} = \frac{U_n - i}{U_n + i} \quad V_n = \frac{U_n - i}{U_n + i} \quad V_{n+1} \text{ en fonction de } U_n$$

$$V_{n+1} = \frac{\frac{U_n - i}{U_n + i} - i}{\frac{U_n - i}{U_n + i} + i} \times (U_n + i) = \frac{U_n - i - i(U_n + i)}{U_n - i + i(U_n + i)}$$

$$\textcircled{4} \quad a_n = \frac{(-1)^p}{\pi(2p+1)} - \frac{(-1)^p}{\pi(2p-1)} = \frac{(-1)^p(2p-1) - (-1)^p(2p+1)}{\pi(2p+1)(2p-1)}$$

$$a_n = \frac{(-1)^p 2p - (-1)^p - (-1)^p(2p) - (-1)^p}{\pi(4p^2-1)} = \frac{-2(-1)^p}{\pi(4p^2-1)} = \frac{2(-1)^{p+1}}{\pi(4p^2-1)}$$

$$\textcircled{6} \quad S = \frac{\pi^6}{980} \quad T = \frac{1}{16}T + S \Rightarrow T - \frac{1}{16}T = S \Rightarrow \frac{15}{16}T = S$$

$$\Rightarrow T =$$

$$⑥ V = \frac{\pi^4}{96} \quad U = \frac{1}{16} U + V \Rightarrow U - \frac{1}{16} U = V \Rightarrow \frac{15}{16} U = V$$

$$\Rightarrow U = \frac{16}{15} V = \frac{16}{15} \frac{\pi^4}{96} = \frac{\pi^4}{90}$$

$$⑧ \frac{x}{(1+x^2)(1+xy)} + \frac{y}{(1+y^2)(1+xy)} = \frac{x(1+y^2) + y(1+x^2)}{(1+x^2)(1+y^2)(1+xy)}$$

$$= \frac{x + xy^2 + y + yx^2}{(1+x^2)(1+y^2)(1+xy)} = \frac{x+y + xy(y+x)}{(1+x^2)(1+y^2)(1+xy)}$$

$$= \frac{(x+y)(1+xy)}{(1+x^2)(1+y^2)(1+xy)}$$

$$\textcircled{10} \quad y(\theta) = \cos(\theta) \cdot \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$y'(\theta) = -\sin\theta \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) + \cos\theta \left(1 + \tan^2\frac{\theta}{2}\right) \frac{1}{2} \quad t = \tan\frac{\theta}{2}$$

$$= -\frac{t}{1+t^2} \cdot t + \frac{1-t^2}{1+t^2} (1+t^2) \frac{1}{2}$$

$$= \frac{-4t^2 + (1-t^2)(1+t^2)}{(1+t^2) \cdot 2} = \frac{-4t^2 + 1 - t^4}{2(1+t^2)}$$

III Séries Alternées

Def: la série $\sum u_n$ est alternée lorsque tunc, $u_n \cdot u_{n+1} < 0$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{si } u_0 > 0, \text{ alors } u_1 < 0, u_2 > 0, \dots \\ \text{si } u_0 < 0, \text{ alors } u_1 > 0, u_2 < 0, \dots \end{array} \right.$$

Def: la série $\sum u_n$ est semi-convergente lorsque $\begin{cases} \sum u_n \text{ CV} \\ \sum |u_n| \text{ DIV} \end{cases}$

Ex: La série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ est semi-convergente

- $\sum_{n=1}^{+\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \quad \sum \frac{1}{n} \text{ DIV (Riemann)}$

- Montre que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ CV c.d $\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N \frac{(-1)^n}{n}$ existe et est finie

$S_N = \sum_{n=1}^N \frac{(-1)^n}{n}$. On montre que les suites $(S_{2N})_{N \in \mathbb{N}}$ et $(S_{2N+1})_{N \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes

- $\underline{S_{2N+1} - S_{2N}} = \sum_{n=1}^{2N+1} \frac{(-1)^n}{n} - \sum_{n=1}^{2N} \frac{(-1)^n}{n} = \frac{(-1)^{2N+1}}{2N+1} = \frac{-1}{2N+1} \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} 0$

- Montrons que la suite $(S_{2N+1})_{N \in \mathbb{N}}$ est croissante :

$$U_{N+1} - U_N = S_{2N+3} - S_{2N+1} = \sum_{n=1}^{2N+3} \frac{(-1)^n}{n} - \sum_{n=1}^{2N+1} \frac{(-1)^n}{n} = \frac{(-1)^{2N+2}}{2N+2} + \frac{(-1)^{2N+3}}{2N+3}$$

$$= \frac{1}{2N+2} - \frac{1}{2N+3} = \frac{2N+3 - (2N+2)}{(2N+2)(2N+3)} = \frac{1}{(2N+2)(2N+3)} > 0$$

la suite $(S_{2N+1})_{N \in \mathbb{N}}$ est croissante

- $\underline{S_{2N+2} - S_{2N}} = \sum_{n=1}^{2N+2} \frac{(-1)^n}{n} - \sum_{n=1}^{2N} \frac{(-1)^n}{n} = \frac{(-1)^{2N+1}}{2N+1} + \frac{(-1)^{2N+2}}{2N+2}$

$$= \frac{-1}{2N+1} + \frac{1}{2N+2} = \frac{-2N-2 + 2N+1}{(2N+1)(2N+2)} = \frac{-1}{(2N+1)(2N+2)} < 0$$

done $\underline{(S_{2N})_{N \in \mathbb{N}}}$ est décroissante

Donc les suites $(S_{2N})_{N \in \mathbb{N}}$ et $(S_{2N+1})_{N \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes, donc elles CV
on appelle S leur limite.

FT Critère des Séries Alternées

Si $\left\{ \begin{array}{l} \sum u_n \text{ est une série alternée} \\ |u_n| \text{ est décroissante (à partir d'un certain rang)} \\ |u_n| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{array} \right.$ alors $\sum u_n$ CV

(CSA)

ex1: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ est alternée ; $\left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \frac{1}{n}$ est décroissante et tend vers 0

donc $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ CV

ex2 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^a}$ ($a > 0$) est alternée et $\left| \frac{(-1)^n}{n^a} \right| = \frac{1}{n^a}$ est décroissante et $\rightarrow 0$

donc $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^a}$ CV

FT Critère des Séries Alternées pratiques:

$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^a}$ CV pour $a > 0$

(CSA)

exercice: Donner la nature de la série de terme général $u_n = \frac{(-1)^n}{n^{2/3}(1 + \frac{(-1)^n}{n^{2/3}})}$, pour $n \geq 2$

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n^{2/3}(1 + \frac{(-1)^n}{n^{2/3}})}.$$

$$\frac{(-1)^n}{n^{2/3}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\text{DL de } \frac{1}{1+x} = 1 - x + \mathcal{O}(x)$$

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n^{2/3}} \cdot \left(1 - \frac{(-1)^n}{n^{2/3}} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^{2/3}}\right)\right) = \underbrace{\frac{(-1)^n}{n^{2/3}}}_{U_n} - \underbrace{\frac{1}{n^{2/3}} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^{2/3}}\right)}_{w_n}$$

- $\sum U_n$ CV (CSA)

- $w_n \underset{+ \infty}{\sim} -\frac{1}{n^{2/3}}$ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{2/3}}$ CV (Riemann) $\Rightarrow \underline{\sum w_n}$ CV (T de N)

donc $\sum u_n$ CV (CV + CV = CV)

$$\text{ex2: } u_n = \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$$

Natuur de $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$?

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \mathcal{O}(x^3)$$

$$u_n = \underbrace{\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}_{w_n} - \underbrace{\frac{1}{2n}}_{o(n)} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right)$$

• $\sum w_n$ CV (CSA)

$$\bullet w_n \sim -\frac{1}{2n} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \text{ Div (Riemann)} \Rightarrow \sum -\frac{1}{2n} \text{ Div } (x - \frac{1}{2})$$

$$\Rightarrow \underline{\sum w_n \text{ Div}}$$

$$\underline{\underline{\sum u_n \text{ Div}}} \quad (\text{CV} + \text{Div} = \text{Div})$$

ex3 : Nature de la série de terme général $u_n = \sin\left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$

$$u_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \text{ ok} . \quad \sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \text{ CV (CSA)} \Rightarrow \sum u_n \text{ CV} \quad (\cancel{\text{pas de T des N avec les } (-1)^n})$$

$$u_n = \underbrace{\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}_{v_n} - \underbrace{\frac{(-1)^n}{6n^{3/2}}}_{w_n} + o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right) \quad \begin{aligned} &\bullet \sum v_n \text{ CV (CSA)} \\ &\bullet |w_n| \sim \frac{1}{6n^{3/2}} \end{aligned}$$

$$\sum_2^{+\infty} \frac{1}{n^{3/2}} \text{ CV (Riemann)} \Rightarrow \sum_2^{+\infty} \frac{1}{6n^{3/2}} \text{ CV} \Rightarrow \sum |w_n| \text{ CV (T des N)}$$

$$\Rightarrow \sum w_n \text{ CV} \quad (\text{CVA} \Rightarrow \text{CV}) \quad \text{donc} \quad \underline{\sum u_n \text{ CV}} \quad (\text{CV} + \text{CV} = \text{CV})$$

IT

Si $\sum u_n$ est alternée
 $|u_n|$ est décroissante et tend vers 0 ($qd n \rightarrow +\infty$)

Alors $S = \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$ est du signe du premier terme u_{n_0}

$$S = \sum_{n=n_0}^{N} u_n + \sum_{N+1}^{+\infty} u_n = S_N + R_N$$

R_N est du signe des premiers termes u_{N+1}

$$|R_N| \leq |u_{N+1}|$$

S est comprise entre 2 sommes partielles consécutives
(S est entre S_N et S_{N+1})