

Meilleur

① D.S.F. de $\sin x$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ (rayon } \infty)$$

② DL de $\sin x$ à l'ordre 5

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + O(x^5)$$

③ Que vaut $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{3^{2n}}{(2n)!} = \cos(3)$

④ def de la Matrice de Lissage de B à B'

$$L_{B \rightarrow B'} = \begin{pmatrix} \text{coord de} \\ \vec{v} \text{ dans } B' \\ \text{en } B \end{pmatrix} \text{ où } B' = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{\omega})$$

⑤ dérivées de $\tan x$

$$\tan' x = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$$

ex 24 $\delta\omega = (e^y + ye^x)dx + (xe^y + e^x)dy$ est-elle totale exacte
(peut-on trouver f telle que $df = \delta\omega$?)

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

$$\Omega = e^y + ye^x \quad \partial_x \Omega = xe^y + e^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial \Omega}{\partial y} = e^y + e^x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial \Omega}{\partial x} = e^y + e^x$$

les dérivées croisées sont égales ($\frac{\partial \Omega}{\partial y} = \frac{\partial \Omega}{\partial x}$),
donc on peut intégrer.

C'est une forme diff totale exacte

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial x} = e^y + ye^x \Rightarrow f(x,y) = xe^y + ye^x + g(y) \\ \frac{\partial f}{\partial y} = xe^y + e^x \end{array} \right. \leftarrow \text{on pose } g(y) \text{ au lieu de cte}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = xe^y + e^x = \frac{\partial f}{\partial x} = xe^y + e^x + g'(y) \Rightarrow g'(y) = 0 \Rightarrow g(y) = \text{cte}$$

$$f(x,y) = xe^y + ye^x + \text{cte}$$

$$\text{ex 25 : } \delta\omega = \underbrace{(x^2+xy)}_Q dx + \underbrace{(y+x^2y)}_Q dy$$

$$\frac{\partial Q}{\partial y} = x \quad \text{et} \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2xy \quad \frac{\partial Q}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x}. \quad \text{On ne peut intégrer.}$$

$$\text{ex 26 : } \delta\omega = \underbrace{(x^2+xy)}_Q dx + \underbrace{(y+\frac{x^2}{2})}_Q dy$$

$$\frac{\partial Q}{\partial y} = x \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = x \quad \text{On peut intégrer.} \quad \delta\omega = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial x} = x^2+xy \\ \frac{\partial f}{\partial y} = y+\frac{x^2}{2} \end{array} \right. \Rightarrow f(x,y) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2}y + g(y) \quad (\text{côte})$$

$$\downarrow$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x^2}{2} + g'(y) \Rightarrow g'(y) = y \Rightarrow g(y) = \frac{y^2}{2} + \text{côte}$$

donc $f(x,y) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2}y + \frac{y^2}{2} + \text{côte}$

VII Recherche d'extrema

Rappel : Notion de Masse : $\mathcal{H} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(A)$ $S = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ $T = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$

Rappel : Taylor à l'ordre 2 pour $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + o((x-a)^3)$$

TAYLOR ORDRE 2 en (a, b) , pour $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y) = f(a, b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y-b) + \frac{1}{2!} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b)(x-a)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b)(x-a)(y-b) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b)(y-b)^2 \right] + \text{reste}$$

Rappel : $z = f(a, b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y-b) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b)(y-b)^2$ + reste

est l'éq du plan tangent

$$\boxed{\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}} \dots$$

]
] donne la position de la surface par rapport
au plan tangent

On veut le signe de $\left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a,b)(x-a)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a,b)(x-a)(y-b) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a,b)(y-b)^2 \right]$

$$\begin{aligned} [\dots] &= (y-b)^2 \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a,b) \left(\frac{x-a}{y-b} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a,b) \frac{x-a}{y-b} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a,b) \right] \\ &= (y-b)^2 [r X^2 + 2s X + t] \end{aligned}$$

On veut le signe du polynôme $\mathcal{P}(X) = rX^2 + 2sX + t$ où $X = \frac{x-a}{y-b}$

$$\Delta = 4s^2 - 4rt = 4(s^2 - rt)$$

Si $s^2 - rt > 0$, il y a 2 racines \neq , donc $[\dots]$ change de signe
la surface traverse le plan tangent

Si $s^2 - rt < 0$, alors, $[\dots]$ est du signe de r
si $r > 0$, alors $[\dots] > 0$, la surface est au dessus du plan tangent

$\lambda \neq 0$, alors $\lambda^{-1} < 0$, la surface est en dessous du plan tangent

ex1 $f(x,y) = xy$. Trouver les extréma de f (les 2 dérives partielles s'annulent)

on veut:
$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \quad (\Rightarrow) \quad \begin{cases} y = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$
 un seul candidat $A(0,0)$.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0 = \lambda \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 1 = \delta$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0 = \tau \quad \Delta_{\text{rt}} = 1 \quad \text{côtum col ou un point selle}$$

Ex 2 $f(x,y) = x^2 + y^2$ Exrema? $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x$ $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y$

les candidats vérifient $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = 0 \\ 2y = 0 \end{cases}$ Un seul candidat: A(0,0)

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2 = r \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0 = s \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2 = t$$

$$\Delta = st - rt = -4 \quad [\dots] \text{ est du signe de } r : [\dots] > 0$$

La surface est au dessus du plan tangent. C'est un minimum

Exrema: les candidats sont donnés par le système $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$

Si $s^2 - rt > 0$, c'est un point col

Si $s^2 - rt < 0$ et $r > 0$, c'est un minimum

Si $s^2 - rt < 0$ et $r < 0$, c'est un maximum

ex 3 $f(x,y) = xe^y + ye^x$ Extrema?

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} e^y + ye^x = 0 \\ xe^y + e^x = 0 \end{cases} \stackrel{x \neq 0}{\Rightarrow} \begin{cases} xe^y + xye^x = 0 \\ xe^y + e^x = 0 \end{cases} \Rightarrow xye^x = e^x$$

$$\Downarrow$$

$$xy = 1$$

$$\Downarrow$$

$$y = \frac{1}{x}$$


$$xe^{\frac{1}{x}} + e^x = 0$$

$$> 0 + > 0 \Rightarrow x < 0$$

$$g(x) = xe^{\frac{1}{x}} + e^x$$

On étudie g sur $\mathbb{R} - \{0\}$

$$g'(x) = e^{\frac{1}{x}} + xe^{\frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) + e^x = e^{\frac{1}{x}} - \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x} + e^x > 0$$



$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{\frac{1}{x}} + e^x &= 0 \cdot e^{-\infty} + 1 \\ &= 0 \cdot 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

$$g(-1) = -1e^{-1} + e^{-1} = 0$$

g est strictement croissante,
continue, de $-\infty$ à 1.
Elle s'annule une seule fois

Un seul candidat $A(-1, -1)$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^y + y e^x \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x e^y + e^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = y e^x \quad r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(-1, -1) = -e^{-1}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = e^y + e^x \quad s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(-1, -1) = e^{-1} + e^{-1} = 2e^{-1}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x e^y \quad t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(-1, -1) = -e^{-1}$$

$$\Delta = st - rt = 4e^{-2} - e^{-2} = 3e^{-2} > 0$$

Point culminant