

第三章 常用函数

本章主要介绍五类常用的函数：对数函数，指数函数，幂函数，反三角函数，双曲函数，其中前三类函数已经在高中学过，包括函数的定义，图像和性质。在此我们首先对这三类函数的相关知识做一下回顾，然后学习后两种新的函数。

§3.1 对数，指数函数

以前的学习是从函数的定义域，值域和对应法则三个方面入手，这里我们从函数的原始定义出发。

§3.1.1 自然对数函数

由上一章的学习可知，函数 $x \mapsto 1/x$ 在 \mathbb{R}_+^* 上是连续的，所以存在原函数，并且在1处为0的原函数唯一。

定义 3.1.1 在 \mathbb{R}_+^* 上，函数 $x \mapsto 1/x$ 在1处为0的唯一原函数称为自然对数函数，记为 \ln ，即

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \ln x = \int_1^x \frac{du}{u}.$$

命题 3.1.1 自然对数函数 \ln 满足 $\forall x, y \in \mathbb{R}_+^*$,

- 1) $\ln(xy) = \ln x + \ln y.$
- 2) $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y.$
- 3) $\forall n \in \mathbb{Z}, \ln(x^n) = n \ln x.$
- 4) $\ln \in C^\infty(\mathbb{R}_+^*),$ 且 $\ln' x = \frac{1}{x}.$
- 5) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty, \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty.$

定理 3.1.1 自然对数函数 \ln 是 \mathbb{R}_+^* 到 \mathbb{R} 的严格单调递增的双射。

§3.1.2 自然指数函数

由定理3.1.1 可知, 自然对数函数 \ln 有反函数.

定义 3.1.2 自然对数函数的反函数称为自然指数函数, 记为 \exp , 即

$$\begin{aligned}\exp : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}_+^* \\ x &\longmapsto \ln^{-1}(x)\end{aligned}$$

也就是说, $\forall x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}_+^*, y = \exp(x) \iff x = \ln y$, 即 $\exp \circ \ln = \text{Id}_{\mathbb{R}_+^*}$, $\ln \circ \exp = \text{Id}_{\mathbb{R}}$. 方便起见, 记 $\exp(x) = e^x$.

注 3.1.1 令 $e = \exp(1)$, 则 $\ln e = 1$, 这是唯一使得自然对数函数取值为1 的点. 它是一个无理数, 保留五位小数为2.71828.

命题 3.1.2 自然指数函数 \exp 满足:

- 1) $\exp 0 = 1$.
- 2) $\forall x, y \in \mathbb{R}, \exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$.
- 3) $\forall x, y \in \mathbb{R}, \exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$.
- 4) $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, \exp(nx) = (\exp(x))^n$.
- 5) $\exp \in C^\infty(\mathbb{R})$, 且 $\exp'(x) = \exp(x)$.
- 6) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(x) = +\infty$.

定理 3.1.2 自然指数函数 \exp 是 \mathbb{R} 到 \mathbb{R}_+^* 的严格单调递增的双射.

§3.1.3 以任意给定实数为底的对数函数

定义 3.1.3 设 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 将定义在 \mathbb{R}_+^* 上的函数 $x \mapsto \frac{\ln x}{\ln a}$ 称为以 a 为底的对数函数, 记为 \log_a , 即

$$\begin{aligned}\log_a : \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\ln x}{\ln a}\end{aligned}$$

命题 3.1.3 设 $a > 0$ 且 $a \neq 0$, 则以 a 为底的对数函数 \log_a 满足:

- 1) $\log_a 1 = 0, \log_a a = 1.$
- 2) $\forall x, y \in \mathbb{R}_+^*, \log_a(xy) = \log_a x + \log_a y.$
- 3) $\forall x, y \in \mathbb{R}_+^*, \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y.$
- 4) $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \forall n \in \mathbb{Z}, \log_a(x^n) = n \log_a x.$
- 5) $\log_a \in C^\infty(\mathbb{R}_+^*),$ 且 $\log'_a x = \frac{1}{x \ln a}.$
- 6) $0 < a < 1$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = -\infty;$
 $a > 1$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty.$

定理 3.1.3 设 $a > 0$ 且 $a \neq 1.$

- 1) $0 < a < 1$ 时, \log_a 是 \mathbb{R}_+^* 到 \mathbb{R} 上严格单调递减的双射.
- 2) $a > 1$ 时, \log_a 是 \mathbb{R}_+^* 到 \mathbb{R} 上严格单调递增的双射.

§3.1.4 以任意给定实数为底的指数函数

由定理3.1.3 可知, \log_a 有反函数.

定义 3.1.4 设 $a > 0$ 且 $a \neq 1, \log_a$ 的反函数称为以 a 为底的指数函数, 记为 \exp_a .
即 $\forall x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}_+^*,$

$$y = \exp_a x \iff x = \log_a y.$$

方便起见, 记 $a^x = \exp_a x, \forall x \in \mathbb{R}.$

命题 3.1.4

- 1) $\forall a \in \mathbb{R}_+, a^0 = 1$ (规定 $0^0 = 1$).
- 2) $\forall a \in \mathbb{R}_+^*, \forall x, y \in \mathbb{R}, a^{x+y} = a^x a^y.$
- 3) $\forall a \in \mathbb{R}_+^*, \forall x, y \in \mathbb{R}, a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}.$
- 4) $\forall a \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, a^{nx} = (a^x)^n.$
- 5) $\exp_a \in C^\infty(\mathbb{R}),$ 且 $(a^x)' = \ln a \cdot a^x.$

6) $0 < a < 1$ 时, $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$;
 $a > 1$ 时, $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$.

定理 3.1.4 设 $a > 0$ 且 $a \neq 1$.

1) $0 < a < 1$ 时, \exp_a 是 \mathbb{R} 到 \mathbb{R}_+^* 上严格单调递减的双射.

2) $a > 1$ 时, \exp_a 是 \mathbb{R} 到 \mathbb{R}_+^* 上严格单调递增的双射.

§3.2 幂函数

§3.2.1 基本定义

以上定义了 \exp 和 \ln 两个函数, 下面用他们定义幂函数.

定义 3.2.1 形如

$$\begin{aligned}\varphi_a : \quad \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R}_+^* \\ x &\longmapsto \exp(a \ln x)\end{aligned}$$

的函数都称为幂函数, 其中 $a \in \mathbb{R}$. 方便起见, 记 $x^a = \exp(a \ln x)$, $x \in \mathbb{R}_+^*$.

命题 3.2.1 设 $a, b \in \mathbb{R}$, $x > 0$, $y > 0$. 则

1) $x^a y^a = (xy)^a$, $x^a x^b = x^{a+b}$, $(x^a)^b = x^{ab}$.

2) $1^a = 1$, $x^0 = 1$.

3) $\ln(x^a) = a \ln x$.

4) $(x^a)' = ax^{a-1}$.

定理 3.2.1

1) $a > 0$ 时, 幂函数 $x \mapsto x^a$ 是 \mathbb{R}_+^* 到 \mathbb{R}_+^* 的严格单调递增的双射.

2) $a < 0$ 时, 幂函数 $x \mapsto x^a$ 是 \mathbb{R}_+^* 到 \mathbb{R}_+^* 的严格单调递减的双射.

§3.2.2 函数之间的比较

在第一章中已经提及过, 此处再次回顾.

命题 3.2.2

1) 幂幂: 设 $\alpha < \beta$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{x^\beta} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^\beta}{x^\alpha} = 0$.

2) 对幂: 设 $\alpha, \beta > 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha |\ln x|^\beta = 0$.

3) 幂指: 设 $\alpha, \beta > 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^{\beta x}} = 0$.

证明 2) 首先证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

因为 $\forall t \geq 1$, 都有 $t \geq \sqrt{t}$. 故 $\forall x \geq 1$, 有

$$0 \leq \ln x = \int_1^x \frac{dt}{t} \leq \int_1^x \frac{dt}{\sqrt{t}} = 2\sqrt{x} - 2 \leq 2\sqrt{x}.$$

故

$$0 \leq \frac{\ln x}{x} \leq \frac{2}{\sqrt{x}}.$$

由夹挤定理即得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

下面证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha} = 0$.

设 $x > 1$, 则

$$\frac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha} = \left(\frac{\ln x}{x^{\alpha/\beta}} \right)^\beta = \left(\frac{\beta}{\alpha} \right)^\beta \left(\frac{\ln(x^{\alpha/\beta})}{x^{\alpha/\beta}} \right)^\beta.$$

因为 $x > 1$ 且 $\alpha, \beta > 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\alpha/\beta} = +\infty$. 根据复合函数的极限, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha} = 0$. 对于第二个极限, 只需做变换 $x \rightarrow 1/x$ 即可.

3) 在2) 中用 $\exp x$ 代替 x 即得. □

§3.3 反三角函数

学生已经学过三角函数, 并且掌握了三角函数在定义域内各个区间的单调性. 本节要讲的反三角函数便是三角函数在特定区间上的反函数.

§3.3.1 反正弦函数

定义 3.3.1 正弦函数 \sin 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上连续且严格单调递增, 故 \sin 是 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 到 $[-1, 1]$ 上的双射, 存在反函数. 其反函数称为反正弦函数, 记为 \arcsin .

命题 3.3.1 由反正弦函数的定义可得:

- 1) $\forall x \in [-1, 1], \sin(\arcsin x) = x.$
- 2) $\forall \theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \arcsin(\sin \theta) = \theta.$
- 3) 奇函数: $\forall x \in [-1, 1], \arcsin(-x) = -\arcsin x.$
- 4) $\forall x \in]-1, 1[, \arcsin' x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$

问题: $\forall \theta \in \mathbb{R}, \arcsin(\sin \theta) = ?$

例子 3.3.1 计算 $\arcsin(\sin \frac{5\pi}{6})$.

定理 3.3.1 \arcsin 是 $[-1, 1]$ 到 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 的严格单调递增的双射.

§3.3.2 反余弦函数

定义 3.3.2 余弦函数 \cos 在区间 $[0, \pi]$ 上连续且严格单调递减, 故 \cos 是 $[0, \pi]$ 到 $[-1, 1]$ 上的双射, 存在反函数. 其反函数称为反余弦函数, 记为 \arccos .

命题 3.3.2 由反余弦函数的定义可得:

- 1) $\forall x \in [-1, 1], \cos(\arccos x) = x.$
- 2) $\forall \theta \in [0, \pi], \arccos(\cos \theta) = \theta.$
- 3) $\forall x \in]-1, 1[, \arccos' x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$

问题: $\forall \theta \in \mathbb{R}, \arccos(\cos \theta) = ?$

例子 3.3.2 计算 $\arccos(\cos(-\frac{\pi}{3}))$.

例子 3.3.3

- 1) 化简 $y = \cos(\arcsin x)$ 和 $y = \sin(\arccos x), x \in [-1, 1].$
- 2) 证明: $\forall x \in [-1, 1], \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}.$

定理 3.3.2 \arccos 是 $[-1, 1]$ 到 $[0, \pi]$ 的严格单调递增的双射.

§3.3.3 反正切函数

定义 3.3.3 正切函数 \tan 在区间 $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ 上连续且严格单调递减, 故 \tan 是 $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ 到 \mathbb{R} 上的双射, 存在反函数. 其反函数称为反正切函数, 记为 \arctan .

命题 3.3.3 由反正切函数的定义可得:

- 1) $\forall x \in \mathbb{R}, \tan(\arctan x) = x.$
- 2) $\forall \alpha \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[, \arctan(\tan \alpha) = \alpha.$
- 3) $\forall x \in \mathbb{R}, \arctan' x = \frac{1}{1+x^2}.$

注 3.3.1 根据命题3.3.3-1) 可得:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

进而,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sin(\arctan x) = \tan(\arctan x) \cos(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

定理 3.3.3 \arctan 是 \mathbb{R} 到 $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ 的严格单调递增的双射.

§3.4 双曲函数

§3.4.1 双曲正弦函数和双曲余弦函数

定义 3.4.1 如下定义在 \mathbb{R} 上的两个函数分别称为反双曲正弦函数, 记为 sh , 和反双曲余弦函数, 记为 ch

$$\text{sh} : x \mapsto \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \text{ch} : x \mapsto \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

命题 3.4.1 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

- 1) $e^x = \text{ch}x + \text{sh}x, e^{-x} = \text{ch}x - \text{sh}x.$
- 2) $\text{ch}^2 x - \text{sh}^2 x = 1.$
- 3) $\text{ch}, \text{sh} \in C^\infty(\mathbb{R})$, 且 $\text{ch}' = \text{sh}, \text{sh}' = \text{ch}.$

定理 3.4.1

- 1) sh 是 \mathbb{R} 到 \mathbb{R} 的严格单调递增的双射.
- 2) $\text{ch}_{|\mathbb{R}_+}$ 是 \mathbb{R}_+ 到 $[1, +\infty[$ 的严格单调递增的双射, $\text{ch}_{|\mathbb{R}_-}$ 是 \mathbb{R}_- 到 $[1, +\infty[$ 的严格单调递减的双射.

§3.4.2 双曲正切函数

由双曲正弦和双曲余弦函数的定义可知: $\forall x \in \mathbb{R}$, $\text{ch}x > 0$, 故 $\forall x \in \mathbb{R}$, $\frac{\text{sh}x}{\text{ch}x}$ 都有意义; $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $\text{sh}x \neq 0$, 故 $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $\frac{\text{ch}x}{\text{sh}x}$ 都有意义. 由此定义双曲正切函数和双曲余切函数.

定义 3.4.2 如下定义在 \mathbb{R} 上的函数称为双曲正切函数, 记为 th

$$\text{th} : x \mapsto \frac{\text{sh}x}{\text{ch}x} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}.$$

如下定义在 \mathbb{R}^* 上的函数称为双曲余切函数, 记为 \coth

$$\coth : x \mapsto \frac{\text{ch}x}{\text{sh}x} = \frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1}.$$

命题 3.4.2 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

- 1) $\text{th} \in C^\infty(\mathbb{R})$, 且 $\text{th}' = \frac{1}{\text{ch}^2} = 1 - \text{th}^2$.
- 2) $\coth \in C^\infty(\mathbb{R}^*)$, 且 $\coth' = -\frac{1}{\text{sh}^2} = 1 - \coth^2$.

定理 3.4.2

- 1) th 是 \mathbb{R} 到 $[-1, 1[$ 的严格单调递增的双射.
- 2) $\coth_{|\mathbb{R}_+^*}$ 是 \mathbb{R}_+^* 到 $]1, +\infty[$ 的严格单调递减的双射, $\coth_{|\mathbb{R}_-^*}$ 是 \mathbb{R}_-^* 到 $]-\infty, -1[$ 的严格单调递减的双射.

§3.4.3 反双曲正弦函数和反双曲余弦函数

由上节可知, 双曲正弦函数是 \mathbb{R} 到 \mathbb{R} 的严格单调递增的连续双射, 故存在反函数. 同理, 双曲余弦函数限制到 \mathbb{R}_+ 上是从 \mathbb{R}_+ 到 $[1, +\infty[$ 的严格单调递增的双射, 故也存在反函数.

定义 3.4.3

- 1) 双曲正弦函数在 \mathbb{R} 上的反函数称为反双曲正弦函数, 记为 argsh , 且

$$\forall x \in \mathbb{R}, \text{argsh}x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}).$$

- 2) 双曲余弦函数在 \mathbb{R}_+ 上的反函数称为反双曲余弦函数, 记为 argch , 且

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \text{argch}x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}).$$

命题 3.4.3

- 1) $\forall x \in \mathbb{R}, \text{argsh}(\text{sh}x) = \text{sh}(\text{argsh}x) = x.$
- 2) $\forall x \geq 1, \text{ch}(\text{argch}x) = x, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \text{argch}(\text{ch}x) = |x|.$
- 3) $\forall x \in \mathbb{R}, \text{ch}(\text{argsh}x) = \sqrt{1+x^2}, \quad \forall x \geq 1, \text{sh}(\text{argch}x) = \sqrt{x^2 - 1}.$
- 3) $\forall x \in \mathbb{R}, \text{argsh}'x = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}; \quad \forall x \in]1, +\infty[, \text{argch}'x = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}.$

定理 3.4.3

- 1) argsh 是 \mathbb{R} 到 \mathbb{R} 上严格单调递增的双射.
- 2) argch 是 $[1, +\infty[$ 到 \mathbb{R}_+ 上严格单调递增的双射.

§3.4.4 反双曲正切函数

双曲正切函数是 \mathbb{R} 到 $] -1, 1[$ 的严格单调递增的连续双射, 故存在反函数; \coth 限制在 \mathbb{R}_+^* 上是 \mathbb{R}_+^* 到 $]1, +\infty[$ 的严格单调递减的双射, 故也存在反函数.

定义 3.4.4

1) 双曲正切函数在 \mathbb{R} 上的反函数称为反双曲正切函数, 记为 argth , 且

$$\forall x \in]-1, 1[, \operatorname{argth} x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{x+1}{1-x}\right).$$

2) \coth 限制在 \mathbb{R}_+^* 上的反函数称为反双曲余切函数, 记为 $\operatorname{argcoth}$, 且

$$\forall x \in]1, +\infty[, \operatorname{argcoth} x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right).$$

命题 3.4.4

$$1) \forall x \in]-1, 1[, \operatorname{argth}' x = \frac{1}{1-x^2}.$$

$$2) \forall x \in]1, +\infty[, \operatorname{argcoth}' x = -\frac{1}{x^2-1}.$$

定理 3.4.4

1) argth 是 $] -1, 1[$ 到 \mathbb{R} 的严格单调递增的双射.

2) $\operatorname{argcoth}$ 是 $]1, +\infty[$ 到 \mathbb{R}_+^* 的严格单调递减的双射.

§3.5 复指数函数

设 $I \subset \mathbb{R}$, $\varphi : I \rightarrow \mathbb{C}$, 则 e^φ 是定义在 I 上取值于 \mathbb{C} 的指数函数. 根据前面学习的复函数的可导性可得:

命题 3.5.1 设 $I \subset \mathbb{R}$, $\varphi : I \rightarrow \mathbb{C}$. 若 φ 在 I 上可导, 则 e^φ 在 I 上可导, 且

$$(e^\varphi)' = \varphi' e^\varphi.$$

例子 3.5.1

1) 设 $\alpha \in \mathbb{C}$, 定义 $\varphi_\alpha : t \mapsto e^{\alpha t}$, 则 φ_α 在 \mathbb{R} 上可导, 且

$$\forall t \in \mathbb{R}, \varphi'_\alpha(t) = \alpha \varphi_\alpha(t).$$

2) 设 $r : I \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $\theta : I \rightarrow \mathbb{R}$ 在 I 上可导, 定义 $f : t \mapsto r(t)e^{i\theta(t)}$, 则 f 在 I 上可导, 且

$$\forall t \in I, f'(t) = r'(t)e^{i\theta(t)} + ir(t)\theta'(t)e^{i\theta(t)}$$