

## 第二章 极限,连续,导数,积分

### §2.1 极限

高中的学习内容中没有极限,只是在学习导数时体现过极限的思想.因此,我们以语言描述的形式以及简单的例子开始.

#### §2.1.1 数列极限

##### §2.1.1.1 基本定义

高中学过:按照一定顺序排列着的一列数称为数列,一般形式写为

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$$

简记为 $\{a_n\}$ .事实上,如果把每个数中的下标 $n$ 看做自变量,这个数的取值看做函数值,则数列便可以看做是定义域为离散点集的函数.

**定义 2.1.1** 我们将函数 $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ 称为实数列(suite réelle),并将 $u(n)$ 记为 $u_n$ ,将该实数列记为 $u$ 或 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .所有实数列的集合记为 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ .

**定义 2.1.2** 设 $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ ,

- 1) 称 $u$ 为常数列(constante),如果 $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_{n+1}$ .
- 2) 称 $u$ 有上界(majorée),如果存在实数 $M$ ,使得 $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$ .
- 3) 称 $u$ 有下界(minorée),如果存在实数 $m$ ,使得 $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$ .
- 4) 称 $u$ 有界(bornée),如果它既有上界又有下界.
- 5) 称 $u$ 单调递增(croissante),如果 $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$ ;称 $u$ 严格单调递增(strictement croissante),如果 $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} > u_n$ .
- 6) 称 $u$ 单调递减(décroissante),如果 $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq u_n$ ;称 $u$ 严格单调递减(strictement décroissante),如果 $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} < u_n$ .
- 7) 称 $u$ 单调(monotone),如果它单调递增或单调递减;称 $u$ 严格单调(strictement monotone),如果它严格单调递增或严格单调递减.

**例子 2.1.1**  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2, u_n = \frac{1}{n+1}, u_n = n, u_n = a^n, a \in \mathbb{R}_+, u_n = (-1)^n, u_n = \sin \frac{\theta}{2^n}, \theta \in ]0, \frac{\pi}{2}[$ .

### §2.1.1.2 有限极限(数列收敛 suite convergente)

**定义 2.1.3** 设  $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ . 若  $\exists l \in \mathbb{R}$ , 使得当  $n$  无限增大时,  $u_n$  无限趋近于  $l$ , 即  $|u_n - l|$  无限趋近于 0, 则称数列  $u$  以  $l$  为极限(limite), 或者称数列  $u$  收敛到  $l$ , 记为  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$  或  $\lim u = l$ , 其中  $\infty$  读作“无穷大” (infini).

不收敛的数列称为发散数列(suite divergente).

\*  $\epsilon - N$  语言. (建议不讲, 先做大量计算)

### 例子 2.1.2

1)  $\frac{1}{n} \rightarrow 0; a^n \rightarrow 0 (0 < a < 1)$ .

2)  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (-1)^n, u_n = 2^n, u_n = a^n (a > 1)$  发散.

**定理 2.1.1 (唯一性)** 若实数列  $u$  收敛, 则它的极限唯一.

**定理 2.1.2 (有界性)** 设  $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  收敛, 则  $u$  有界, 即存在正实数  $M$ , 使得  $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$ .

**定理 2.1.3** 设  $u, v \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  收敛.

1) 保号性: 若  $\lim u > 0 (< 0)$ , 则存在  $n_0 \in \mathbb{N}$ , 当  $n \geq n_0$  时,  $u_n > 0 (< 0)$ .

2) 保序性: 若  $\lim u > (<) \lim v$ , 则存在  $n_0 \in \mathbb{N}$ , 当  $n \geq n_0$  时,  $u_n > (<) v_n$ .

**推论 2.1.1** 设  $u, v \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  收敛.

1) 若存在  $n_0 \in \mathbb{N}$ , 使得  $\forall n \geq n_0, u_n \geq 0 (\leq 0)$ , 则  $\lim u \geq 0 (\leq 0)$ ;

2) 若存在  $n_0 \in \mathbb{N}$ , 使得  $\forall n \geq n_0, u_n \geq v_n (\leq 0)$ , 则  $\lim u \geq \lim v (\leq)$ .

**注 2.1.1** 上面推论中的结果对严格不等号不成立, 如:  $u_n = \frac{2}{n}, v_n = \frac{1}{n}$ .

**推论 2.1.2** 设  $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  收敛到实数  $l$ , 则  $|u| = (|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$  也收敛且收敛到  $|l|$ . 反之不一定成立.

**推论 2.1.3** 设  $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ ,  $l \in \mathbb{R}$  且  $\lim u = l \neq 0$ , 则存在  $n_0 \in \mathbb{N}$ , 使得数列  $(1/u_n)_{n \geq n_0}$  收敛到  $1/l$ .

**命题 2.1.1 (四则运算)** 设  $u, v \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  是两个收敛数列, 则  $u + v$  和  $u \cdot v$  都收敛且

- 1)  $\lim(u + v) = \lim u + \lim v$ ;
- 2)  $\lim u \cdot v = \lim u \cdot \lim v$ ;
- 3) 若  $\lim v \neq 0$ , 则存在  $n_0 \in \mathbb{N}$ , 使得数列  $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)_{n \geq n_0}$  收敛, 且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n}{\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n}$$

**注 2.1.2**

- 1) 收敛数列与发散数列的和是发散数列; 积的敛散性不能确定, 如  $u_n = 1/n$ ,  $v_n = n$  和  $v_n = n^2$ ;
- 2) 发散数列与发散数列的和与积的敛散性不能确定, 如  $u_n = 1 + (-1)^n$ ,  $v_n = 1 - (-1)^n$  和  $v_n = (-1)^n$ ; 再如  $u_n = (n + \frac{1}{n})^2 - n^2$ .

**推论 2.1.4 (数列收敛的线性性质)** 设  $u, v \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  收敛,  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ . 则  $\lambda u + \mu v$  收敛且

$$\lim(\lambda u + \mu v) = \lambda \lim u + \mu \lim v.$$

特别地, 考虑收敛到0的数列:

**定义 2.1.4** 设  $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ , 若  $\lim u = 0$ , 则称  $u$  为无穷小数列.

**命题 2.1.2** 设  $u, v \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ , 若  $\lim u = 0$ ,  $v$  有界, 则  $\lim uv = 0$ , 即无穷小数列与有界数列的乘积仍为无穷小数列.

**例子 2.1.3**

- 1)  $u_n = \frac{3^n - (-2)^n}{3^n + (-2)^n}$ ;
- 2)  $u_n = \frac{n^3 + 5n}{5n^3 + \cos n + \frac{1}{n^2}}$ .

### §2.1.1.3 无穷极限(数列不收敛)

定义 2.1.5 设  $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ .

- 1) 若当  $n$  无限增大时,  $u_n > 0$  且无限增大, 则称  $u$  的极限是  $+\infty$ , 记为  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$  或  $\lim u = +\infty$ ;
- 2) 若当  $n$  无限增大时,  $u_n < 0$  且  $|u_n|$  无限增大, 则称  $u$  的极限是  $-\infty$ , 记为  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$  或  $\lim u = -\infty$ .

注 2.1.3  $u$  收敛当且仅当  $\lim u$  存在且有限. 故若  $\lim u = +\infty$  或  $-\infty$ , 则  $u$  的极限存在, 但不收敛.

定理 2.1.4 (自然保号性) 设  $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ ,

- 1) 若  $\lim u = +\infty$ , 则  $\forall M > 0$ , 总存在  $n_0 \in \mathbb{N}$ , 使得当  $n \geq n_0$  时,  $u_n > M$ ;
- 2) 若  $\lim u = -\infty$ , 则  $\forall m < 0$ , 总存在  $n_0 \in \mathbb{N}$ , 使得当  $n \leq n_0$  时,  $u_n < m$ .

命题 2.1.3 (四则运算) 设  $u, v \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ ,  $\lim u = +\infty$ , 则

- 1) 若  $v$  有下界, 则  $\lim(u + v) = +\infty$ ;
- 2) 若存在  $n_0 \in \mathbb{N}$  和  $m > 0$  使得  $\forall n \geq n_0, v_n \geq m$ , 即数列  $(v_n)_{n \geq n_0}$  有正的下界, 则  $\lim uv = +\infty$ .

例子 2.1.4  $u_n = \sqrt{n}, v_n = \frac{1}{n}$ . 虽然  $u \rightarrow +\infty, v$  有下界, 但  $uv \not\rightarrow +\infty$ , 因为找不到这样的  $n_0$ , 使得自此之后的  $v$  有正的下界.

### §2.1.1.4 0 与 $\infty$ 的倒数关系

命题 2.1.4 设  $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  收敛, 若  $\lim u = 0$ , 则

- 1) 若存在  $n_0 \in \mathbb{N}$  使得  $\forall n \geq n_0, u_n > 0$ , 则数列  $(1/u_n)_{n \geq n_0}$  趋于  $+\infty$ ;
- 2) 若存在  $n_0 \in \mathbb{N}$  使得  $\forall n \geq n_0, u_n < 0$ , 则数列  $(1/u_n)_{n \geq n_0}$  趋于  $-\infty$ .

例子 2.1.5  $\frac{(-1)^n}{n}$ , 振动.

**命题 2.1.5** 设  $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  且  $\lim u = +\infty$  ( $-\infty$ ), 则存在  $n_0 \in \mathbb{N}$  使得  $\forall n \geq n_0, u_n > (<)0$  且数列  $(1/u_n)_{n \geq n_0}$  收敛到 0.

**注 2.1.4** 设  $u, v \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  分别以  $l, m$  为极限, 其中  $l, m \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ . 只要  $l + m$  和  $lm$  能确定, 则有  $\lim(u + v) = l + m, \lim uv = lm$ . 如  $l = +\infty, m \neq -\infty$ , 则  $l + m = +\infty$ , 能确定; 再如  $l = +\infty, m = 0$ , 则  $lm$  不能确定. 下面列出四则运算的表格....

交待符号:  $\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ .

几个常用极限:

- 1)  $\lim c = c, c$  为任意常数;
- 2)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ ;
- 3)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0, |q| < 1, \lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty, q > 1$ ;
- 4)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$ ;
- 5)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin \frac{1}{n} / \frac{1}{n} = 1$ ;
- 6)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln^\alpha n}{n^\beta} = 0, \alpha, \beta > 0$ ;
- 7)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{e^{\beta n}} = 0, \alpha, \beta > 0$ ;
- 8)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{n^n} = 0$ .

### §2.1.1.5 数列收敛的判定

**定理 2.1.5 (夹挤定理(encadrement))** 设  $u, v \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  收敛, 且  $\lim u = \lim v = l$ . 若数列  $w$  满足

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \leq w_n \leq v_n,$$

则  $w$  收敛, 且  $\lim w = l$ .

**例子 2.1.6**  $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2 + k^2}$ .

**推论 2.1.5** 设  $u, v \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ , 且  $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ , 使得  $\forall n \geq n_0, u_n \leq v_n$ , 则

- 1) 若  $\lim u = +\infty$ , 则  $\lim v = +\infty$ ;
- 2) 若  $\lim v = -\infty$ , 则  $\lim u = -\infty$ .

**例子 2.1.7**  $u_n = \sum_{k=1}^n \sqrt{k}$ .

下面研究单调数列的极限, 为此, 先介绍一下确界原理的相关内容.

**命题 2.1.6** 设  $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ .

- 1) 若  $u$  有上界, 则它有无穷多个上界.
- 2) 若  $u$  有下界, 则它有无穷多个下界.

**定义 2.1.6 (上, 下确界)** 设  $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ .

- 1) 若  $u$  有上界, 则将最小的上界称为  $u$  的上确界 (borne supérieure), 记为  $\sup_{n \in \mathbb{N}} u_n$  或  $\sup u$ .
- 2) 若  $u$  有下界, 则将最大的下界称为  $u$  的下确界 (borne inférieure), 记为  $\inf_{n \in \mathbb{N}} u_n$  或  $\inf u$ .

**注 2.1.5** 上下确界一定是有限实数.

**例子 2.1.8**  $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \sin \frac{\pi}{n}$ .

**定理 2.1.6 (确界原理)**

- 1) 有上界的数列一定有上确界;
- 2) 有下界的数列一定有下确界;
- 3) 有界数列既有上确界又有下确界.

由此便可对单调数列得到如下结论:

**命题 2.1.7** 设  $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ .

- 1) 设  $u$  单调递增, 则

- 若 $u$  有上界, 则当 $n$  充分大时,  $u$  无限趋近于 $\sup u$ ;
- 若 $u$  无上界, 则当 $n$  充分大时,  $u$  无限趋近于 $+\infty$ .

2) 设 $u$  单调递减, 则

- 若 $u$  有下界, 则当 $n$  充分大时,  $u$  无限趋近于 $\inf u$ ;
- 若 $u$  无下界, 则当 $n$  充分大时,  $u$  无限趋近于 $-\infty$ .

**定理 2.1.7 (单调极限定理)**

- 1) 单调数列一定有极限;
- 2) 单调有界数列一定收敛.

**例子 2.1.9**  $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ .

**定义 2.1.7 (毗邻数列)** 设 $u, v \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ , 称 $u$  和 $v$  是毗邻数列(suites adjacentes), 如果满足以下条件:

- 1)  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$ ;
- 2)  $u$  单调递增,  $v$  单调递减;
- 3)  $v - u$  收敛到0.

**定理 2.1.8 (毗邻数列收敛定理)** 设 $u, v$  是毗邻数列, 则它们收敛到同一值. 若将该极限值记为 $l$ , 则 $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq l \leq v_n$ .

设 $a \in \mathbb{R}$ , 用 $[a]$  表示小于等于 $a$  的最大整数, 即 $a - 1 < [a] \leq a$ . 由此考虑一下例子.

**例子 2.1.10** 设 $x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{[10^n x]}{10^n}, v_n = \frac{1 + [10^n x]}{10^n}$ , 则 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  和 $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  是毗邻数列且  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = x$ .

**证明** 设 $x \in \mathbb{R}$ , 由于 $[10^n x] \leq 10^n x$ , 故

$$10[10^n x] \leq 10^{n+1}x.$$

又因为 $10[10^n x]$  是整数, 故

$$10[10^n x] \leq [10^{n+1} x],$$

从而

$$u_{n+1} - u_n = \frac{[10^{n+1} x]}{10^{n+1}} - \frac{[10^n x]}{10^n} \geq 0.$$

□

**例子 2.1.11**  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \sum_{p=0}^n \frac{(-1)^p}{p+1}$ . 证明:  $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  和  $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$  是毗邻数列.

下面介绍子列定理.

**定义 2.1.8** 称函数  $\phi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  严格单调递增, 如果  $\forall n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ ,

$$n_1 > n_2 \implies \phi(n_1) > \phi(n_2).$$

**定义 2.1.9** 设  $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ , 函数  $\phi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  严格单调递增, 则数列  $(u_{\phi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$  称为数列  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  的子数列, 简称子列(suite extraite).

**注 2.1.6** 函数  $\phi$  一定满足:  $\forall n \in \mathbb{N}, \phi(n) \geq n$ .

**例子 2.1.12**

- 1)  $(u_{n+3})_{n \in \mathbb{N}}$  是  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  的子列;
- 2)  $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  和  $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$  是  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  的子列, 分别称为奇数列和偶数列;
- 3) 有限数列  $1, 3, 9, 13$  不是数列  $(n)_{n \in \mathbb{N}}$  的子列.

**定理 2.1.9 (Bolzano-Weierstrass 定理)** 有界数列至少有一个收敛子列. 更确切地说, 设  $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  有界, 则存在  $l \in \mathbb{R}$  和严格单调递增函数  $\phi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ , 使得  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{\phi(n)} = l$ .

**定理 2.1.10 (子列定理)** 设  $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ , 则  $\lim u = l$  当且仅当任给  $u$  的子列  $v$ , 则  $\lim v = l$ .

**推论 2.1.6** 设  $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, l \in \mathbb{R}$ .

- 1) 若  $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  和  $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$  都收敛到  $l$ , 则  $u$  收敛到  $l$ ;



2) 若存在不收敛的子列, 则 $u$  不收敛;

3) 若存在两个收敛的子列, 但不收敛到同一值, 则 $u$  不收敛.

注 2.1.7 子列定理一般用来判定数列发散, 特别对于具有周期性的数列, 如 $\cos(\frac{n\pi}{5})_{n \in \mathbb{N}}$ .

例子 2.1.13  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \sum_{p=0}^n \frac{(-1)^p}{p+1}$ . 证明:  $u$  收敛.

### §2.1.1.6 递归数列的极限

定义 2.1.10 (递归数列) 设 $I \subset \mathbb{R}$ , 函数 $f$  满足 $f(I) \subset I$ . 令

$$u_0 \in I, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n),$$

则称 $u$  为由函数 $f$  定义的递归数列.

例子 2.1.14 设 $a \in [-1, +\infty[$ .

$$u_0 = a, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n},$$

则 $u$  是由函数 $f: x \mapsto \sqrt{1+x}$  定义的递归数列.

此处先利用作图法讲解如何求递归数列的极限, 后面学习了函数的连续性之后再做理论证明.

求递归数列极限的步骤:

1. 确定区间 $I$ , 使得 $u_0 \in I$  且 $f(I) \subset I$ ;
2. 作图:
  - 在直角坐标系 $xoy$  下画出区间 $I$  上的曲线 $y = f(x)$ ;
  - 画出一三象限的角平分线 $y = x$ ;
  - 标出以 $(u_0, 0)$  为坐标的点, 记为 $M_0$ ;
  - 过 $M_0$  作 $x$  轴的垂线, 与曲线 $y = f(x)$  交于点 $(u_0, u_1)$ , 记为 $M'_0$ ;
  - 过 $M'_0$  作 $y$  轴的垂线, 与直线 $y = x$  交于点 $(u_1, u_1)$ , 记为 $M''_0$ ;
  - 过 $M''_0$  作 $x$  轴的垂线, 与 $x$  轴交于点 $(u_1, 0)$ , 记为 $M_1$ ;

- 在从点  $M_1$  重复上面的过程.
3. 求出曲线  $y = f(x)$  与直线  $y = x$  的交点, 记为  $(x_0, x_0)$ ;
  4. 通过曲线走向判断数列的单调性, 由此判断极限是否存在;
  5. 若极限存在, 在  $\pm\infty$  和  $x_0$  中寻找数列的极限.

### §2.1.1.7 复数列

**定义 2.1.11** 称复值函数  $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$  为复数列, 并将  $u(n)$  记为  $u_n$ , 将该数列记为  $u$  或  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ . 所有复数列组成的集合记为  $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ .

$\forall u \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ , 定义如下几个与之相关的数列:

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} u &= \{\operatorname{Re}(u_n)\}_{n \in \mathbb{N}}, & \operatorname{Im} u &= \{\operatorname{Im}(u_n)\}_{n \in \mathbb{N}} \\ |u| &= \{|u_n|\}_{n \in \mathbb{N}} & \bar{u} &= \{|\overline{u_n}|\}_{n \in \mathbb{N}} \end{aligned}$$

本小节出现的  $|\cdot|$  指复数的模, 不是绝对值.

鉴于复数之间无法比较大小, 故不能定义其上下界和单调性, 但可利用模定义其有界性.

**定义 2.1.12** 称  $u$  为有界数列, 如果存在  $M \in \mathbb{R}_+$ , 使得  $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$ .

**定义 2.1.13** 设  $u \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}, l \in \mathbb{C}$ . 若当  $n$  无限增大时,  $|u_n - l|$  无限趋近于 0, 则称  $u$  收敛到  $l$ , 记为  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$  或  $\lim u = l$ .

**注 2.1.8**  $l \in \mathbb{C}$ , 不存在  $\pm\infty$  的情况.

对复数列而言, 当  $|z| < 1$  时,  $z^n \rightarrow 0$  也成立.

**定理 2.1.11** 设  $u \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}, l \in \mathbb{C}$ , 则下面结论等价

- 1)  $u$  收敛到  $l$ ;
- 2)  $\operatorname{Re} u$  和  $\operatorname{Im} u$  分别收敛到  $\operatorname{Re} l$  和  $\operatorname{Im} l$ .

**例子 2.1.15**

1)  $u_n = (1 + \frac{1}{2^n}) + (2 + \frac{1}{2^n})i$ , 收敛到  $1 + 2i$ .

2)  $u_n = 1 + ni$ , 不收敛.

3)  $u_n = r_n e^{i\theta_n}$ , 其中  $\{r_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \{\theta_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  分别收敛到  $r$  和  $\theta$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = r e^{i\theta}.$$

4) 设  $\forall n \in \mathbb{N}, z_{n+1} = \frac{1}{3}(z_n + 2\bar{z}_n)$ , 证明:  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  收敛且求其极限.

5) 设  $z_n = x_n + iy_n$ , 其中  $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = \frac{x_n - y_n}{2}, y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}$ . 证明  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  和  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  收敛且求其极限.

## §2.1.2 函数极限

本节中  $f$  是定义在  $\mathbb{R}$  的子集上的实函数,  $D(f)$  表示其定义域. 为了研究  $f$  在点  $a \in \mathbb{R}$  和  $\pm\infty$  处的极限, 首先要求  $f$  在“ $a$  和  $\pm\infty$  的附近”有定义. 为此, 先介绍区间和邻域.

### §2.1.2.1 区间(intervale) 和邻域(voisinage)

**定义 2.1.14** 设  $a, b \in \mathbb{R}$ , 不妨设  $a < b$ .

- 1) 称实数集  $\{x \in \mathbb{R} | a < x < b\}$  为开区间, 记为  $]a, b[$ ;
- 2) 称实数集  $\{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\}$  为闭区间, 记为  $[a, b]$ ;
- 3) 称实数集  $\{x \in \mathbb{R} | a \leq x < b\}$  和  $\{x \in \mathbb{R} | a < x \leq b\}$  为半开半闭区间, 分别记为  $[a, b[$  和  $]a, b]$ .

这几类区间统称为有限区间.

**定义 2.1.15** 设  $a \in \mathbb{R}$ .

- 1) 将实数集  $\{x | x \leq a\}$  记为  $] - \infty, a]$ ,  $\{x | x < a\}$  记为  $] - \infty, a[$ ;
- 2) 将实数集  $\{x | x \geq a\}$  记为  $[a, +\infty[$ ,  $\{x | x > a\}$  记为  $]a, +\infty[$ ;
- 3) 将实数集  $\{x | -\infty < x < +\infty\}$  记为  $] - \infty, +\infty[$ , 即  $\mathbb{R} = ] - \infty, +\infty[$ .

这几类区间统称为无限区间.

**注 2.1.9** 由区间的定义可知, 区间没有间断点, 例如 $[1, 2] \cup ] - 3, 0]$  就不是区间.

**定义 2.1.16** 设 $a \in \mathbb{R}$ ,  $\delta > 0$ .

- 1) 称闭区间 $[a - \delta, a + \delta]$  为 $a$  的 $\delta$ -邻域, 记为 $U(a, \delta)$ ;
- 2) 称闭区间 $[a - \delta, a]$  为 $a$  的 $\delta$ -左邻域, 记为 $U_-(a, \delta)$ ;
- 3) 称闭区间 $[a, a + \delta]$  为 $a$  的 $\delta$ -右邻域, 记为 $U_+(a, \delta)$ .

**注 2.1.10** 一般地, 若只需要 $a$  的某个邻域, 则不需要指明 $\delta$ . 故用 $U(a)$  表示 $a$  的某个邻域,  $U_-(a)$  表示 $a$  的某个左邻域,  $U_+(a)$  表示 $a$  的某个右邻域.

**定义 2.1.17** 设 $a \in \mathbb{R}$ ,  $\delta > 0$ .

- 1) 称实数集 $[a - \delta, a + \delta] \setminus \{a\}$  为 $a$  的空心 $\delta$ -邻域, 记为 $U^\circ(a, \delta)$ ;
- 2) 称左闭右开区间 $[a - \delta, a[$  为 $a$  的空心 $\delta$ -左邻域, 记为 $U_-^\circ(a, \delta)$ ;
- 3) 称左开右闭区间 $]a, a + \delta]$  为 $a$  的空心 $\delta$ -右邻域, 记为 $U_+^\circ(a, \delta)$ .

**注 2.1.11**

- 1) 类似地, 用 $U^\circ(a)$  表示 $a$  的某个空心邻域,  $U_-^\circ(a)$  表示 $a$  的某个空心左邻域,  $U_+^\circ(a)$  表示 $a$  的某个空心右邻域.
- 2)  $U(a)$  与 $U^\circ(a)$  的区别在于是否包含 $a$ .
- 3) 对于 $\pm\infty$ , 只谈邻域, 不提左右或是否空心.

**定义 2.1.18**

- 1)  $[A, +\infty[$  称为 $+\infty$  的邻域, 记为 $U(+\infty)$ , 其中 $A > 0$  充分大;
- 2)  $] - \infty, B]$  称为 $-\infty$  的邻域, 记为 $U(-\infty)$ , 其中 $B < 0$ ,  $|B|$  充分大.

**例子 2.1.16**

$$1) \quad \begin{array}{l} f: [-1, 1] \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \sqrt{1-x^2} \end{array} \quad \text{在 } 0 \text{ 的邻域有定义;}$$

$$2) \quad \begin{array}{l} f: \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \frac{\sin x}{x} \end{array} \quad \text{在 } 0 \text{ 的空心邻域有定义;}$$

$$3) \quad \begin{array}{l} f: \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \frac{1}{\sqrt{x}} \end{array} \quad \text{在 } 0 \text{ 的空心右邻域有定义.}$$

下面主要研究函数  $f$  在  $a$  的空心邻域内的性质, 即  $a$  不一定属于  $D(f)$ .

### §2.1.2.2 有限点处的有限极限

**定义 2.1.19** 设  $a \in \mathbb{R}$ ,  $f$  在  $a$  的某个空心邻域内有定义. 如果当  $x$  无限趋近于  $a$  但不等于  $a$  时,  $f(x)$  无限趋近于某个实数  $l$ , 则称  $f$  在  $a$  处以  $l$  为极限, 记为  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$  或  $\lim_a f = l$ .

\*  $\epsilon - \eta$  语言: 设  $a, l \in \mathbb{R}$ , 则  $\lim_a f = l$  可用数学语言描述为:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0 : \forall x \in D(f), 0 < |x - a| \leq \eta \implies |f(x) - l| \leq \epsilon.$$

#### 例子 2.1.17

$$1) \text{ 设 } l \in \mathbb{R}, \text{ 若 } \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = l, \text{ 则 } \forall a \in \mathbb{R}, \lim_a f = l.$$

$$2) \text{ 设 } \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x, \text{ 则 } \forall a \in \mathbb{R}, \lim_a f = a. \text{ } f \text{ 称为 } \mathbb{R} \text{ 上的恒同映射, 记为 } Id_{\mathbb{R}}.$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1}, \lim_{x \rightarrow a} \sqrt{1 - x^2}, |a| < 1.$$

**定理 2.1.12 (唯一性)** 若函数  $f$  在  $a$  处有极限, 则极限唯一.

**定理 2.1.13 (局部有界性)** 设  $a \in \mathbb{R}, l \in \mathbb{R}$ , 若  $\lim_a f = l$ , 则存在  $a$  的某个空心邻域  $U^\circ(a)$ , 使得  $f$  在  $U^\circ(a)$  上有界.

**定理 2.1.14** 设  $a \in \mathbb{R}, f, g$  在  $a$  的某个邻域内有定义.

$$1) \text{ 局部保号性: 若 } \lim_a f > (<) 0, \text{ 则存在 } a \text{ 的某个空心邻域 } U^\circ(a), \text{ 使得在 } U^\circ(a) \text{ 内 } f > 0 (< 0).$$

2) 局部保序性: 若  $\lim_a f > (<) \lim_a g$ , 则存在  $a$  的某个空心邻域  $U^\circ(a)$ , 使得在  $U^\circ(a)$  内  $f > (<)g$ .

**注 2.1.12** 以上定理对  $\leq$  和  $\geq$  不一定成立. 如  $f : x \mapsto x \cos x$ , 则  $\lim_0 f = 0$ , 但在 0 的任何空心邻域内  $f$  都变号.

**推论 2.1.7** 设  $a \in \mathbb{R}$ ,  $f, g$  在  $a$  的某个邻域内有定义.

- 1) 若存在  $a$  的某个空心邻域  $U^\circ(a)$ , 使得在  $U^\circ(a)$  内  $f \geq (\leq) 0$ , 则  $\lim_a f \geq (\leq) 0$ ;
- 2) 若存在  $a$  的某个空心邻域  $U^\circ(a)$ , 使得在  $U^\circ(a)$  内  $f \geq (\leq) g$ , 则  $\lim_a f \geq (\leq) \lim_a g$ .

**注 2.1.13** 以上推论对严格不等号不一定成立, 即若在  $a$  的某个空心邻域内  $f < g$ , 不一定有  $\lim f < \lim g$ . 如  $f : x \mapsto x \sin x$ ,  $g : x \mapsto x \tan x$ . 换句话说, 如果有  $f > g$ , 那么取极限后只能得到  $\lim \geq \lim g$ .

**推论 2.1.8** 设  $a, l \in \mathbb{R}$ ,  $\lim_a f = l$ , 则  $\lim_a |f| = |l|$ .

**推论 2.1.9** 设  $a \in \mathbb{R}$ , 若  $\lim_a f = l \neq 0$ , 则  $\lim_a \frac{1}{f} = \frac{1}{l}$ .

**命题 2.1.8 (四则运算( $\mathbb{R}$ 上))** 设  $a \in \mathbb{R}$ , 函数  $f$  和  $g$  在  $a$  的某个空心邻域内有定义, 在  $a$  处的极限存在且有限, 则  $f \pm g$  和  $f \times g$  在  $a$  处的极限也存在有限且

- 1)  $\lim_a (f \pm g) = \lim_a f \pm \lim_a g$ ;
- 2)  $\lim_a (f \times g) = \lim_a f \times \lim_a g$ ;
- 3) 若  $\lim_a g \neq 0$ , 则  $\lim_a \left(\frac{f}{g}\right) = \frac{\lim_a f}{\lim_a g}$ .

**推论 2.1.10 (函数极限的线性性质)** 设  $a \in \mathbb{R}$ ,  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ . 函数  $f$  和  $g$  在  $a$  的某个空心邻域内有定义且极限存在, 则  $\lambda f + \mu g$  在  $a$  处的极限也存在且

$$\lim_a (\lambda f + \mu g) = \lambda \lim_a f + \mu \lim_a g.$$

**例子 2.1.18**  $\lim_{x \rightarrow -1} \left( \frac{1}{x+1} - \frac{3}{x^3+1} \right)$ .

**定义 2.1.20** 设  $a \in \mathbb{R}$ , 函数  $f$  在  $a$  的某个空心邻域内有定义. 若  $\lim_a f = 0$ , 则称  $f$  为当  $x \rightarrow a$  时的无穷小量.

**命题 2.1.9** 设  $a \in \mathbb{R}$ ,  $\lim_a f = 0$ ,  $g$  在  $a$  的某个空心邻域内有界, 则  $\lim_a (f \times g) = 0$ , 即无穷小量与有界量的乘积仍为无穷小量.

**例子 2.1.19**  $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x}$ .

**命题 2.1.10 (函数极限与数列极限的关系( $\mathbb{R}$  上))** 设  $a, l \in \mathbb{R}$ ,  $\lim_a f = l$ ,  $u$  是取值于  $D(f)$  的实数列. 若  $\lim u = a$ , 则  $\lim f(u) = l$ .

**例子 2.1.20**

$$1) \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \cos \frac{1}{n+k};$$

$$2) \text{ 若已知 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \text{ 证明: } \lim_{n \rightarrow +\infty} n \sin \frac{1}{n} = 1.$$

**重要极限:**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ .

**命题 2.1.11 (复合函数的极限( $\mathbb{R}$  上))** 设  $a, l \in \mathbb{R}$ ,  $\lim_a g = l$ ,  $f$  取值于  $D(g)$ . 若  $\lim_r f = a$ , 则

$$\lim_r g \circ f = l.$$

**例子 2.1.21**  $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{x - \pi}$ .

### §2.1.2.3 有限点处的无穷极限

**定义 2.1.21** 设  $a \in \mathbb{R}$ ,  $f$  在  $a$  的某个空心邻域有定义.

1) 若当  $x$  无限趋近于  $a$  时,  $f(x) > 0$  且无限增大, 则称函数  $f$  在  $a$  点以  $+\infty$  为极限, 记为  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$  或  $\lim_a f = +\infty$ ;

2) 若当  $x$  无限趋近于  $a$  时,  $f(x) < 0$  且  $|f(x)|$  无限增大, 则称函数  $f$  在  $a$  点以  $-\infty$  为极限, 记为  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$  或  $\lim_a f = -\infty$ .

\*  $A - \eta$  语言: 设  $a \in \mathbb{R}$ . 则  $\lim_a f = +\infty$  可用数学语言描述为:

$$\forall A > 0, \exists \eta > 0: \forall x \in D(f), 0 < |x - a| \leq \eta \implies f(x) \geq A.$$

例子 2.1.22  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$ .

注 2.1.14 局部无界, 自然保号.

定义 2.1.22 设  $a \in \mathbb{R}$ , 函数  $f$  在  $a$  的某个空心邻域内有定义. 若  $\lim_a f = +\infty$  或  $-\infty$ , 则称  $f$  为  $x \rightarrow a$  时的无穷大量.

命题 2.1.12 (四则运算( $\infty$  时)) 设  $a \in \mathbb{R}$ , 函数  $f$  和  $g$  在  $a$  的某个邻域内有定义且  $\lim_a f = +\infty$ , 则

- 1) 若  $g$  在  $a$  的某个邻域内有下界, 则  $\lim_a (f + g) = +\infty$ ;
- 2) 若  $g$  在  $a$  的某个邻域内有正的下界, 则  $\lim_a (f \times g) = +\infty$ .

例子 2.1.23  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sin x)$ .

命题 2.1.13 设  $a \in \mathbb{R}$ , 函数  $f$  在  $a$  的某个空心邻域内有定义且  $\lim_a f = +\infty$ , 则  $\lim_a \frac{1}{f} = 0$ .

#### §2.1.2.4 $\pm\infty$ 处的有限极限

定义 2.1.23

- 1) 设  $f$  在  $+\infty$  的某个邻域有定义, 若当  $x$  取正值且无限增大时,  $f(x)$  无限趋近于某个常数  $l$ , 则称  $f$  在  $+\infty$  处以  $l$  为极限, 记为  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$  或  $\lim_{+\infty} f = l$ ;
- 2) 设  $f$  在  $-\infty$  的某个邻域有定义. 若当  $x$  取负值且  $|x|$  无限增大时,  $f(x)$  无限趋近于某个常数  $l$ , 则称  $f$  在  $-\infty$  处以  $l$  为极限, 记为  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$  或  $\lim_{-\infty} f = l$ .

\*  $\epsilon - M$  语言: 设  $l \in \mathbb{R}$ . 则  $\lim_{+\infty} f = l$  可用数学语言描述为:

$$\forall \epsilon > 0, \exists M > 0: \forall x \in D(f), x \geq M \implies |f(x) - l| \leq \epsilon.$$

例子 2.1.24  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$



其他性质类似: 唯一性, 局部有界性, 局部保号性, 四则运算等.

**重要极限:**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$ .

利用复合函数的极限理解下面数列的极限:

**例子 2.1.25**  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{n^2})^{n^2} = e$ .

### §2.1.2.5 $\pm\infty$ 处的无穷极限

**定义 2.1.24** 设  $f$  在  $\infty$  的某个邻域内有定义.

- 1) 若当  $x$  取正值且无限增大时,  $f(x) > 0$  且无限增大, 则称函数  $f$  在  $+\infty$  处以  $+\infty$  为极限, 记为  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  或  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ ;
- 2) 若当  $x$  取正值且无限增大时,  $f(x) < 0$  且  $|f(x)|$  无限增大, 则称函数  $f$  在  $+\infty$  处以  $-\infty$  为极限, 记为  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$  或  $\lim_{+\infty} f = -\infty$ ;
- 3) 若当  $x$  取负值且  $|x|$  无限增大时,  $f(x) > 0$  且无限增大, 则称函数  $f$  在  $-\infty$  处以  $+\infty$  为极限, 记为  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$  或  $\lim_{-\infty} f = +\infty$ ;
- 4) 若当  $x$  取负值且  $|x|$  无限增大时,  $f(x) < 0$  且  $|f(x)|$  无限增大, 则称函数  $f$  在  $-\infty$  处以  $-\infty$  为极限, 记为  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$  或  $\lim_{-\infty} f = -\infty$ .

\*  $A - M$  语言:  $\lim_{+\infty} f = +\infty$  可用数学语言描述为:

$$\forall A > 0, \exists M > 0: \forall x \in D(f), x \geq M \implies f(x) \geq A.$$

**例子 2.1.26**  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n$ .

其他性质类似. 下面对以上四种极限给出统一两个命题:

**命题 2.1.14 (函数极限与数列极限的关系( $\mathbb{R}$  上))** 设  $a, l \in \mathbb{R}$ ,  $\lim_a f = l$ ,  $u$  是取值于  $D(f)$  的实数列. 若  $\lim u = a$ , 则  $\lim f(u) = l$ .

**命题 2.1.15 (复合函数的极限( $\mathbb{R}$  上))** 设  $a, l \in \mathbb{R}$ ,  $\lim_a g = l$ ,  $f$  取值于  $D(g)$ . 若  $\lim_r f = a$ , 则

$$\lim_r g \circ f = l.$$

**例子 2.1.27**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos \frac{1}{x}$ .

### §2.1.2.6 单侧极限

这里只考虑有限点处的单侧极限, 因为 $\pm\infty$ 处的极限就是单侧极限.

**定义 2.1.25** 设 $a \in \mathbb{R}$ ,  $l \in \overline{\mathbb{R}}$ .

- 1) 函数 $f$ 在 $a$ 的某个空心右邻域有定义, 如果当 $x$ 从 $a$ 的右侧无限趋近于 $a$ 时,  $f(x)$ 无限趋近于 $l$ , 则称 $f$ 在 $a$ 处有右极限(limite à droite)  $l$ , 记为 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = l$  或 $\lim_{a^+} f = l$ ;
- 2) 函数 $f$ 在 $a$ 的某个空心左邻域有定义, 如果当 $x$ 从 $a$ 的左侧无限趋近于 $a$ 时,  $f(x)$ 无限趋近于 $l$ , 则称 $f$ 在 $a$ 处有左极限(limite à gauche)  $l$ , 记为 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = l$  或 $\lim_{a^-} f = l$ .

\*  $\epsilon - \eta$  语言:  $\lim_{a^+} f = l \in \mathbb{R}$  可用数学语言描述为:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0: \forall x \in D(f), 0 < x - a \leq \eta \implies |f(x) - l| \leq \epsilon.$$

**注 2.1.15** 单侧极限主要用来考虑某些特殊点和端点的极限.

#### 例子 2.1.28

- 1)  $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ x, & x < 0 \end{cases}$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = ?$
- 2)  $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$  在 $x = \pm 1$ 处的极限;
- 3)  $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$  在 $x = 0$ 处的极限是.

**注 2.1.16** 设 $f, g$ 在 $a$ 处分别以 $l, m$ 为极限, 其中 $l, m \in \overline{\mathbb{R}}$ . 只要 $l+m$ 和 $lm$ 能确定, 则有 $\lim(f+g) = l+m$ ,  $\lim fg = lm$ . 事实上, 对于加法, 若 $l = +\infty$ , 则只要 $m \neq -\infty$ ,  $l+m$ 就能确定; 对于乘法, 不能确定的情况较多, 需具体分析, 例如:  $\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$ . 则列出以上几种情况下四则运算的表格.....

几个常用极限:

- 1) 常函数在任意点处的极限都是其本身.
- 2)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ ;

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0; 0 < a < 1, \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0, a > 1; \lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1, a > 0;$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1;$$

$$5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e, \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e;$$

$$6) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^{\beta x}} = 0, \alpha, \beta > 0;$$

$$7) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^\alpha x}{x^\beta} = 0, \beta > 0;$$

$$8) \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0; \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\beta \ln^\alpha x = 0, \alpha, \beta > 0.$$

### §2.1.2.7 函数极限的判定

**定理 2.1.15 (夹挤定理)** 设  $a \in \mathbb{R}$ ,  $\lim_a f = \lim_a g = l \in \mathbb{R}$ . 若在  $a$  的某个空心邻域  $U^\circ(a)$  内, 函数  $h$  满足  $f \leq h \leq g$ , 则  $h$  在  $a$  处的极限存在, 且  $\lim_a h = l$ .

**推论 2.1.11** 设  $f \leq g$ ,

$$1) \text{ 若 } \lim_a f = +\infty, \text{ 则 } \lim_a g = +\infty;$$

$$2) \text{ 若 } \lim_a g = -\infty, \text{ 则 } \lim_a f = -\infty.$$

**例子 2.1.29**  $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[ \frac{1}{x} \right], \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \cos e^x}{x^2 + 1}$ .

下面介绍左右极限定理, 这也是判断函数在一点是否有极限的重要工具.

**定理 2.1.16 (左右极限定理)** 设  $a \in \mathbb{R}$ , 函数  $f$  在  $a$  的某个空心邻域内有定义, 则  $f$  在  $a$  处有极限当且仅当  $f$  在  $a$  处的左极限和右极限存在且相等. 也就是说,

$$\lim_a f = l \iff \begin{cases} \lim_{a^+} f = l, \\ \lim_{a^-} f = l. \end{cases}$$

**注 2.1.17** 有上述命题可知, 函数  $f$  在  $a$  点有极限必须具备两个条件:

$$1) f \text{ 在 } a \text{ 点的左右极限都存在};$$

2) 左右极限相等.

**例子 2.1.30**  $f : x \mapsto e^{-\frac{1}{x}}$  和  $g : x \mapsto \operatorname{sgn}(x)$  在 0 处都无极限;  $h(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0 \end{cases}$  在 0 处有极限.

**注 2.1.18** 左右极限定理主要用来判断某些特殊点处的极限是否存在, 它也是判断某点处极限不存在的重要方法.

下面叙述单调极限定理, 为此, 先给出单调函数的定义.

**定义 2.1.26** 设  $I \subset \mathbb{R}$ ,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ .

1) 称  $f$  单调递增, 若  $\forall x_1, x_2 \in I$ ,

$$x_1 \leq x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2);$$

称  $f$  严格单调递增, 若  $\forall x_1, x_2 \in I$ ,

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2);$$

2) 称  $f$  单调递减, 若  $\forall x_1, x_2 \in I$ ,

$$x_1 \leq x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2);$$

称  $f$  严格单调递减, 若  $\forall x_1, x_2 \in I$ ,

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2);$$

3) 称  $f$  单调, 如果它单调递增或单调递减; 称  $f$  严格单调, 如果它严格单调递增或严格单调递减.

其中  $I$  称为单调区间.

**注 2.1.19** 函数的单调性是针对某个区间而言的.

**定义 2.1.27** 设  $I \subset \mathbb{R}$  是一个区间,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ .

1) 若  $f$  有上界, 则将其最小的上界称为上确界, 记为  $\sup_I f$  或  $\sup_{x \in I} f(x)$ ;

2) 若  $f$  有下界, 则将其最大的下界称为下确界, 记为  $\inf_I f$  或  $\inf_{x \in I} f(x)$ .

**定理 2.1.17 (单调极限定理: 区间端点)** 设  $a, b \in \bar{\mathbb{R}}$  且  $a < b$ ,  $f$  在  $]a, b[$  上单调, 则  $\lim_{a^+} f$  和  $\lim_{b^-} f$  存在. 进一步,

1) 若  $f$  单调递增有上界, 则  $\lim_{b^-} f = \sup_{]a, b[} f$ ;

2) 若  $f$  单调递增无上界, 则  $\lim_{b^-} f = +\infty$ ;

3) 若  $f$  单调递增有下界, 则  $\lim_{a^+} f = \inf_{]a, b[} f$ ;

4) 若  $f$  单调递增无下界, 则  $\lim_{a^+} f = -\infty$ .

下面给出函数在单调区间内部点上极限的存在性. 为此, 给出记号  $\dot{I}$ , 表示区间  $I$  的内部.

**定理 2.1.18 (单调极限定理: 区间内点)** 设  $I \subset \mathbb{R}$ ,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  单调,  $c \in \dot{I}$ , 则  $\lim_{c^-} f$  和  $\lim_{c^+} f$  都存在且有限. 进一步,

1) 若  $f$  单调递增, 则  $\lim_{c^-} f \leq f(c) \leq \lim_{c^+} f$ .

2) 若  $f$  单调递减, 则  $\lim_{c^-} f \geq f(c) \geq \lim_{c^+} f$ .

**定理 2.1.19 (归结原则)** 设  $a, l \in \mathbb{R}$ ,  $f$  在  $a$  的某个空心邻域  $U^\circ(a)$  内有定义, 则  $\lim_a f = l$  当且仅当  $U^\circ(a)$  内所有以  $a$  为极限的实数列  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = l$ .

**注 2.1.20**

1) 结合数列极限与函数极限的关系来理解该定理;

2) 归结原则一般用来判断极限不存在, 例如:  $\sin \frac{1}{x}$  在  $0$  点极限不存在.

### §2.1.2.8 复函数的极限

**定义 2.1.28** 取值于复数域 $\mathbb{C}$  的函数称为复函数.

设 $f: D(f) \rightarrow \mathbb{C}$ , 定义如下几个与之相关的函数:

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} f: D(f) &\longrightarrow \mathbb{R} & \operatorname{Im} f: D(f) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \operatorname{Re}(f(x)) & x &\longmapsto \operatorname{Im}(f(x)) \\ |f|: D(f) &\longrightarrow \mathbb{R} & \bar{f}: D(f) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto |f(x)| & x &\longmapsto \overline{f(x)}. \end{aligned}$$

对复函数而言, 我们只考虑 $a \in \mathbb{R}$ ,  $l \in \mathbb{C}$  的情况, 不考虑 $l = \pm\infty$  的情况.

**定义 2.1.29** 设 $a \in \mathbb{R}$ , 复函数 $f$  在 $a$  的某个空心邻域有定义, 若存在 $l \in \mathbb{C}$  使得当 $x$  无限趋近于 $a$  时,  $|f - l|$  无限趋近于0, 则称 $f$  在 $a$  点以 $l$  为极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$  或 $\lim_a f = l$ .

**定理 2.1.20 (复函数极限存在定理)** 设复函数 $f$  在 $a$  的某个空心邻域内有定义,  $l \in \mathbb{C}$ , 则下面结论等价

- 1)  $\lim_a f = l$ ;
- 2)  $\lim_a \operatorname{Re} f = \operatorname{Re} l$  且  $\lim_a \operatorname{Im} f = \operatorname{Im} l$ .

**注 2.1.21** 局部有界性, 四则运算, 函数极限与数列极限的关系, 复合函数的运算, 可逆函数的运算, 单侧极限的定义都成立. 其它涉及比较大小的, 如局部保号性, 局部保序性, 夹挤定理, 单调有极限定理等都不成立.

**推论 2.1.12** 设复函数 $f$  在 $a$  点有极限, 则 $|f|$  和 $\bar{f}$  都在 $a$  点有极限.