

第一章 复数

§1.1 复数域中的基本概念

§1.1.1 复数域

将实数域 \mathbb{R} 上的运算记为 $+$ 和 \times .

设 $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{R}\}$, 且 $(x, y) = (x', y') \iff x = x', y = y'$, 则 \mathbb{R}^2 的元素与平面直角坐标系中的点一一对应. 赋予 \mathbb{R}^2 两种运算 \oplus 和 \otimes 如下: $\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}$,

$$(a, b) \oplus (c, d) = (a + c, b + d),$$
$$(a, b) \otimes (c, d) = (ac - bd, ad + bc).$$

可以验证这两个运算满足交换律, 结合律和分配律, 并且有单位元 $(1, 0)$, 零元 $(0, 0)$. $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$(x, 0) \oplus (y, 0) = (x + y, 0), \quad (x, 0) \otimes (y, 0) = (xy, 0).$$

故横轴上的点在这两个运算下与实数相同, 故将横轴称为实轴, 单位记为 1 . 对于另一个轴,

$$(0, x) \oplus (0, y) = (0, x + y), \quad (0, x) \otimes (0, y) = (-xy, 0),$$

故这个轴与实轴不同, 我们将其称为虚轴, 单位记为 i . 那么此时可以将复数用代数形式表示出来, 即 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$(x, y) = (x, 0) \oplus (0, y) = x(1, 0) \oplus y(0, 1) = x \oplus iy.$$

特别地,

$$i^2 = (0, 1)^2 = (-1, 0) = -1.$$

定义 1.1.1 将 \mathbb{R}^2 连同它上面的两种运算 \oplus 和 \otimes 称为复数域, 记为 \mathbb{C} , 其中 \oplus 和 \otimes 定义如下: $\forall z = (x, y), z' = (x', y') \in \mathbb{C}$,

$$z \oplus z' = (x + x', y + y'), \quad z \otimes z' = (x \times x' - y \times y', x \times y' + x' \times y).$$

方便起见, 仍将 \oplus 记为 $+$, \otimes 记为 \times .

命题 1.1.1 令 i 表示虚数单位, 即 $i = (0, 1) \in \mathbb{C}$, 则 $i^2 = -1$.

定义 1.1.2 $\forall z = (x, y) \in \mathbb{C}$, 则

$$(x, y) = (x, 0) + (0, y) = x(1, 0) + y(0, 1) = x + iy.$$

称 $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$ 为复数 z 的代数形式, 其中 x 和 y 分别称为复数 z 的实部(partie réelle) 和虚部(partie imaginaire), 记为

$$x = \operatorname{Re}(z), \quad y = \operatorname{Im}(z).$$

特别地, 若 $x = 0$, 则称 z 为纯虚数(imaginaire pur). 所有纯虚数组成的集合记为 $i\mathbb{R}$.

在以上定义下, 我们给出一个复数的倒数: 设 $z = x + iy \in \mathbb{C}$, $\frac{1}{z} = x' + iy'$, 其中 $x, y, x', y' \in \mathbb{R}$ 且 $(x, y) \neq (0, 0)$. 根据 $\frac{1}{z} \times z = 1$ 得

$$xx' - yy' = 1, \quad xy' + x'y = 0.$$

解得

$$x' = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad y' = -\frac{y}{x^2 + y^2},$$

即

$$\frac{1}{z} = \frac{x}{x^2 + y^2} - i\frac{y}{x^2 + y^2}.$$

§1.1.2 共轭

定义 1.1.3 设 $z = x + iy \in \mathbb{C}$, 其中 $x, y \in \mathbb{R}$. 称 $x - iy$ 为 z 的共轭(conjugué), 记为 \bar{z} , 即

$$\bar{z} = x - iy.$$

命题 1.1.2 设 $z \in \mathbb{C}$, 则

- 1) $\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$, $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$;
- 2) $\overline{\bar{z}} = z$;
- 3) $z \in \mathbb{R}$ 当且仅当 $z = \bar{z}$;
- 4) z 是纯虚数当且仅当 $z = -\bar{z}$.

命题 1.1.3 (共轭复数的四则运算) 设 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, 则

- 1) $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$;
- 2) $\overline{z_1 \times z_2} = \overline{z_1} \times \overline{z_2}$;
- 3) 若 $z_2 \neq 0$, 则 $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$.

继续回到复平面上来. 设 $z = (x, y) \in \mathbb{C}$, 则该复数对应点 $M(x, y)$. 连接 OM 的到向量 \overrightarrow{OM} . 下面用向量 \overrightarrow{OM} 的长度和实轴到它的角度来刻画一下复数 z 的其他两个量: 模和幅角.

§1.1.3 模

设 $z \in \mathbb{C}$, 简单计算可得 $z\bar{z}$ 为非负实数, 记为 $z\bar{z} \in \mathbb{R}_+$.

定义 1.1.4 设 $z \in \mathbb{C}$, 称 $\sqrt{z\bar{z}}$ 为 z 的模(module), 记为 $|z|$, 即

$$|z| = \sqrt{z\bar{z}}.$$

事实上, 设 $z = x + iy$, 则 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

命题 1.1.4 $\forall z \in \mathbb{C}$, 有

- 1) $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$;
- 2) $|z| = |\bar{z}|$;
- 3) $\operatorname{Re}(z) \leq |\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$;
- 4) $\operatorname{Im}(z) \leq |\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$.

命题 1.1.5 $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 有

- 1) $\frac{1}{\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$;
- 2) $|z| = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{z} = \bar{z}$.

命题 1.1.6 $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, 有

- 1) $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$;

$$2) \text{ 若 } z_2 \neq 0, \text{ 则 } \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|};$$

$$3) |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|;$$

$$4) ||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 - z_2|,$$

其中3), 4) 称为复数的三角不等式.

证明 3) 若 $z_2 = 0$, 则不等式显然成立, 下设 $z_2 \neq 0$. 令 $u = \frac{z_1}{z_2}$, 则

$$\begin{aligned} (1 + |u|)^2 - |1 + u|^2 &= 1 + |u|^2 + 2|u| - (1 + u)(1 + \bar{u}) \\ &= 1 + |u|^2 + 2|u| - 1 - u - \bar{u} - |u|^2 \\ &= 2(|u| - \operatorname{Re}(u)) \\ &\geq 0, \end{aligned}$$

所以, $(1 + |u|)^2 - |1 + u|^2 \geq 0$, 即 $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.

4) $z_1 = z_1 + z_2 - z_2$, 则

$$|z_1| \leq |z_2| + |z_1 - z_2|,$$

故

$$|z_1| - |z_2| \leq |z_1 - z_2|.$$

同理可得

$$|z_2| - |z_1| \leq |z_2 - z_1|.$$

所以

$$-|z_1 - z_2| \leq |z_1| - |z_2| \leq |z_1 - z_2|.$$

□

§1.1.4 模为1 的复数

记 $U = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$. 事实上, U 是复平面上的一个以原点 O 为圆心, 1 为半径的圆. 设 $\theta \in \mathbb{R}$, 记 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, 则

命题 1.1.7 设 $\theta \in \mathbb{R}$, 则 $e^{i\theta} \in \mathbb{C}$ 且

$$1) |e^{i\theta}| = 1;$$

$$2) \overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta};$$

$$3) e^{i(\theta+2k\pi)} = e^{i\theta}, k \in \mathbb{Z}.$$

命题 1.1.8 $z \in U \Leftrightarrow$ 存在 $\theta \in \mathbb{R}$, 使得 $z = e^{i\theta}$.

由以上易得下列命题:

定理 1.1.1 (欧拉(Euler) 公式) 设 $\theta \in \mathbb{R}$, 则

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

例子 1.1.1 将 $\sin^6 \theta$ 线性化.

证明 利用欧拉公式可得

$$\sin^6 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right)^6,$$

则

$$\sin^6 \theta = -\frac{1}{64}(e^{6i\theta} - 6e^{4i\theta} + 15e^{2i\theta} - 20 + 15e^{-2i\theta} - 6e^{-4i\theta} + e^{-6i\theta}).$$

然后将 $e^{ik\theta}$ 和 $e^{-ik\theta}$ 组合可得

$$\begin{aligned} \sin^6 \theta &= -\frac{1}{64}(e^{6i\theta} + e^{-6i\theta} - 6(e^{4i\theta} - e^{-4i\theta}) + 15(e^{2i\theta} + e^{-2i\theta}) - 20) \\ &= -\frac{1}{32}(\cos 6\theta - 6 \cos 4\theta + 15 \cos 2\theta - 10). \end{aligned}$$

□

例子 1.1.2 设 $\theta \in]0, 2\pi[$, 化简 $S = \sum_{k=0}^n \cos k\theta$.

要求: 会利用欧拉公式将 $\cos^m \theta$, $\sin^n \theta$, $\cos^m \theta \sin^n \theta$ 等线性化.

命题 1.1.9 设 $\theta, \phi \in \mathbb{R}$, 则

$$1) e^{i\theta} e^{i\phi} = e^{i(\theta+\phi)}, e^{i\theta} / e^{i\phi} = e^{i(\theta-\phi)};$$

$$2) e^{i\theta} = e^{i\phi} \Leftrightarrow \theta \equiv \phi [2\pi].$$

证明 1)

$$\begin{aligned}e^{i(\theta+\phi)} &= \cos(\theta + \phi) + i \sin(\theta + \phi) \\&= \cos \theta \cos \phi - \sin \theta \sin \phi + i \sin \theta \cos \phi + i \cos \theta \sin \phi \\&= \cos \theta (\cos \phi + i \sin \phi) + i \sin \theta (\cos \phi + i \sin \phi) \\&= (\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \phi + i \sin \phi) \\&= e^{i\theta} e^{i\phi}.\end{aligned}$$

2) $e^{i\theta} = e^{i\phi} \Leftrightarrow (\cos \theta, \sin \theta) = (\cos \phi, \sin \phi)$, 即

$$\cos \theta = \cos \phi, \sin \theta = \sin \phi.$$

所以 θ 和 ϕ 相差 2π 的整数倍.

注意: 1) 说明当指数是纯虚数时, “同底数幂相乘, 底数不变, 指数相加”. \square

注 1.1.1 $\theta \equiv \phi[2\pi]$ 称为“ θ 等于 ϕ 模 2π ”. 事实上, $\theta \equiv \phi[2\pi] \Leftrightarrow \theta = \phi + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, 即 θ 与 ϕ 相差 2π 的整数倍. 这是有关等价类的问题, 将在下一年中学习, 学生需知道类似 $\theta \equiv \phi[2\pi]$ 的这种写法和叫法.

推论 1.1.1 设 $\theta \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, 则 $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$.

定理 1.1.2 (棣莫佛(Moivre) 公式) 设 $\theta \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{Z}$, 则

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta},$$

或写为

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta.$$

例子 1.1.3 设 $\theta \in]0, 2\pi[$, 化简 $S = \sum_{k=0}^n \cos k\theta$.

例子 1.1.4 将 $\sin 5\theta$ 和 $\cos 5\theta$ 表示成 $\cos \theta$ 和 $\sin \theta$ 的函数.

证明 利用Moivre 公式

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^5 = \cos 5\theta + i \sin 5\theta,$$

将左边利用二项式展开并将实虚部分离, 则

$$\cos 5\theta = \cos^5 \theta - 10 \cos^3 \theta \sin^2 \theta + 5 \cos \theta \sin^4 \theta, \quad (1.1.1)$$

$$\sin 5\theta = 5 \cos^4 \theta \sin \theta - 10 \cos^2 \theta \sin^3 \theta + \sin^5 \theta.$$

□

注 1.1.2 在(1.1.1) 中用 $1 - \cos^2 \theta$ 代替 $\sin^2 \theta$ 可得 $\cos 5\theta$ 关于 $\cos \theta$ 的多项式

$$\cos 5\theta = 16 \cos^5 \theta - 20 \cos^3 \theta + 5 \cos \theta.$$

一般地, 设 $n \in \mathbb{N}$, 利用 Moivre 公式可得

$$e^{in\theta} = (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos^{n-k} \theta (i \sin \theta)^k.$$

利用 k 的奇偶性将实虚部分离得

$$\cos n\theta = \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2p} (-1)^p \cos^{n-2p} \theta \sin^{2p} \theta, \quad (1.1.2)$$

$$\sin n\theta = \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2p+1} (-1)^p \cos^{n-(2p+1)} \theta \sin^{2p+1} \theta. \quad (1.1.3)$$

在(1.1.2) 中, 用 $1 - \cos^2 \theta$ 代替 $\sin^2 \theta$ 可得 $\cos n\theta$ 关于 $\cos \theta$ 的多项式. 而在(1.1.3) 中, 用 $1 - \cos^2 \theta$ 代替 $\sin^2 \theta$ 则可将 $\sin n\theta$ 写成 $\cos \theta$ 的多项式与 $\sin \theta$ 的乘积.

例子 1.1.5 将 $\tan 5\theta$ 表示成 $\tan \theta$ 的函数.

证明 由上例得:

$$\begin{aligned} \tan 5\theta &= \frac{5 \cos^4 \theta \sin \theta - 10 \cos^2 \theta \sin^3 \theta + \sin^5 \theta}{\cos^5 \theta - 10 \cos^3 \theta \sin^2 \theta + 5 \cos \theta \sin^4 \theta} \\ &= \frac{5 \tan \theta - 10 \tan^3 \theta + \tan^5 \theta}{1 - 10 \tan^2 \theta + 5 \tan^4 \theta}. \end{aligned}$$

□

要求: 会利用棣莫佛公式将 $\cos m\theta$, $\sin n\theta$ 表示成 $\cos \theta$ 和 $\sin \theta$ 的函数, 将 $\tan n\theta$ 表示成 $\tan \theta$ 的函数.

§1.1.5 幅角

由命题1.1.8可知, 若 $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 则 $\left| \frac{z}{|z|} \right| = 1$. 故存在 $\theta \in \mathbb{R}$ 使得 $\frac{z}{|z|} = e^{i\theta}$, 从而

$$z = |z|e^{i\theta}.$$

定义 1.1.5 设 $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 若 $\theta \in \mathbb{R}$ 满足 $z = |z|e^{i\theta}$, 则称 θ 为 z 的一个幅角(argument).

例子 1.1.6 设 $z = 1 + i$, 则 $z = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$, 即 $\frac{\pi}{4}$ 是 $1 + i$ 的一个幅角. 另外, $\theta = \frac{9\pi}{4}$ 也是它的一个幅角, 故一个复数的幅角不唯一. 事实上, 每一个复数都有无穷多个幅角, 见以下命题.

命题 1.1.10 设 $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, θ_0 是 z 的一个幅角. 则 z 的所有幅角为

$$\theta_0 + 2\pi\mathbb{Z} = \{\theta_0 + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\},$$

记为

$$\arg(z) \equiv \theta_0 [2\pi],$$

表示 z 的任一幅角与 θ_0 相差 2π 的整数倍.

例子 1.1.7 设 $\theta \in [0, 2\pi]$, 求 $z = 1 + e^{i\theta}$ 的幅角.

命题 1.1.11 $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 均可表示成如下三角函数的形式:

$$z = a(\cos \theta + i \sin \theta), \quad a, \theta \in \mathbb{R}, \quad (1.1.4)$$

该式就称为复数 z 的三角形式(forme trigonométrique), 其中不要求 $a = |z|$, 但

- 若 $a > 0$, 则 $|z| = a$, $\arg(z) \equiv \theta [2\pi]$;
- 若 $a < 0$, 则 $|z| = -a$, $\arg(z) \equiv (\theta + \pi) [2\pi]$.

注 1.1.3 设 $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 由命题1.1.10知, z 的幅角有无穷多个, 但在 $]-\pi, \pi]$ 内只有一个.

定义 1.1.6 设 $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 存在唯一的 $\theta \in]-\pi, \pi]$, 满足 $z = |z|e^{i\theta}$. 该 θ 称为 z 的幅角主值(argument principal), 记为 $\text{Arg}(z)$.

§1.1.6 三角形式

上一节中(1.1.4) 给出了复数的三角形式, 本小节我们看一下两个复数的三角形式之间的关系.

命题 1.1.12 设 $z_1, z_2 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 且

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1}, \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2}.$$

则

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}, \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}.$$

证明

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1 (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) \cdot r_2 (\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) \\ &= r_1 r_2 \left((\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) + i (\cos \theta_1 \sin \theta_2 + \sin \theta_1 \cos \theta_2) \right) \\ &= r_1 r_2 \left(\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2) \right) \\ &= r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}. \end{aligned}$$

□

注 1.1.4 不必要求 r_1, r_2 非负.

推论 1.1.2 设 $z_1, z_2 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 则

$$\begin{aligned} \arg(z_1 z_2) &\equiv \arg(z_1) + \arg(z_2) [2\pi], \\ \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) &\equiv \arg(z_1) - \arg(z_2) [2\pi]. \end{aligned}$$

证明 令 $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}, z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$.

• 若 $r_1 > 0, r_2 > 0$, 则

$$\arg(z_1) \equiv \theta_1 [2\pi], \quad \arg(z_2) \equiv \theta_2 [2\pi].$$

而 $z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$, 故

$$\arg(z_1 z_2) \equiv (\theta_1 + \theta_2) [2\pi] \equiv \theta_1 [2\pi] + \theta_2 [2\pi] \equiv \arg(z_1) + \arg(z_2) [2\pi].$$

- 若 $r_1 > 0, r_2 < 0$, 则

$$\arg(z_1) \equiv \theta_1 [2\pi], \quad \arg(z_2) \equiv (\theta_2 + \pi) [2\pi].$$

而 $z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$, 故

$$\arg(z_1 z_2) \equiv (\theta_1 + \theta_2 + \pi) [2\pi] \equiv \theta_1 [2\pi] + (\theta_2 + \pi) [2\pi] \equiv \arg(z_1) + \arg(z_2) [2\pi].$$

- 其他情况类似. □

推论 1.1.3 设 $n \in \mathbb{Z}, z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 则

$$\arg(z^n) \equiv n \arg(z) [2\pi].$$

证明 $n \in \mathbb{Z}^+$ 时, 利用数学归纳法; $n \in \mathbb{Z}^-$ 时, $-n \in \mathbb{Z}^+$, 利用 $\arg\left(\frac{1}{z^{-n}}\right)$. □

§1.1.7 复指数函数

默认学生已熟悉实指数函数 $x \mapsto e^x$ 的相关概念和性质, 下面利用实指数函数来定义复指数函数.

定义 1.1.7 设 $z = x + iy \in \mathbb{C}, x, y \in \mathbb{R}$, 定义 $e^z = e^x e^{iy}$, 则称函数

$$\begin{aligned} \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto e^z \end{aligned}$$

为复指数函数.

显然这是一个 2π 周期函数.

命题 1.1.13 设 $z \in \mathbb{C}$, 则

- 1) $|e^z| = e^{\operatorname{Re}(z)}$;
- 2) $\arg(z) \equiv \operatorname{Im}(z) [2\pi]$.

特别地, $\forall z \in \mathbb{C}, e^z \neq 0$.

定理 1.1.3 (复指数函数的运算规则)

- 1) $\forall z, z' \in \mathbb{C}, e^{z+z'} = e^z e^{z'}$;

$$2) \forall z \in \mathbb{C}, \frac{1}{e^z} = e^{-z}.$$

学完单满映射后再讲本小节剩下的这块内容.

命题 1.1.14 设 $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 则在复指数映射

$$\begin{aligned} \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C}^* \\ z &\longmapsto e^z \end{aligned}$$

下, 至少存在一个 $z_0 \in \mathbb{C}$ 满足 $e^{z_0} = a$. 并且 a 在该映射下的所有原像为 $z_0 + 2ik\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

证明 由于 $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 存在 $\rho > 0, \theta \in \mathbb{R}$ 使得 $a = \rho e^{i\theta}$. 下面求解方程 $e^z = a$. \square

注 1.1.5 由以上命题可知: 复指数映射

$$\begin{aligned} \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C}^* \\ z &\longmapsto e^z \end{aligned}$$

是满射.

§1.2 在 \mathbb{C} 中求解代数方程

§1.2.1 复数的平方根

定义 1.2.1 设 $a \in \mathbb{C}$, 若复数 z 满足 $z^2 = a$, 则称 z 为 a 的平方根(racine carrée).

命题 1.2.1 任何非零复数都有两个互为相反数的平方根.

例子 1.2.1

- 1) 设 $a > 0$, 它的两个平方根是 \sqrt{a} 和 $-\sqrt{a}$.
- 2) 设 $a < 0$, 它的两个平方根是 $i\sqrt{-a}$ 和 $-i\sqrt{-a}$.
- 3) 0 的平方根只有它自身.

注 1.2.1 只有 $a \in \mathbb{R}_+$ 时, 符号 \sqrt{a} 才有意义.

求复数 z 的平方根: 设 $Z = X + iY$, $X, Y \in \mathbb{R}$, 满足 $Z^2 = z$, 则

$$X^2 - Y^2 = \operatorname{Re}(z), \quad 2XY = \operatorname{Im}(z),$$

然后求出 X, Y 的几种可能.

例子 1.2.2 求 $1 + i$ 的平方根.

§1.2.2 求解二次方程

定理 1.2.1 (复系数二次方程的根) 设 $a, b, c \in \mathbb{C}$ 且 $a \neq 0$, 考虑方程

$$az^2 + bz + c = 0, \quad (1.2.5)$$

其判别式(discriminant)为 $\Delta = b^2 - 4ac$.

- 若 $\Delta \neq 0$, 则方程(1.2.6) 有两个不同的根. 若将 Δ 的一个平方根设为 δ , 则这两个不同的根为

$$z = \frac{-b \pm \delta}{2a}.$$

- 若 $\Delta = 0$, 则方程(1.2.6) 有一个二重根 $z_0 = -\frac{b}{2a}$.

注 1.2.2 此处: δ 是 Δ 的平方根, 不能记为 $\sqrt{\Delta}$, 除非 $\Delta \geq 0$.

推论 1.2.1 (实系数二次方程的根) 设 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 且 $a \neq 0$, 考虑方程

$$az^2 + bz + c = 0, \quad (1.2.6)$$

其判别式为 $\Delta = b^2 - 4ac$.

- 若 $\Delta > 0$, 则方程(1.2.6) 有两个不同的实根.
- 若 $\Delta = 0$, 则方程(1.2.6) 有一个二重根.
- 若 $\Delta < 0$, 则方程(1.2.6) 有一对共轭复根.

例子 1.2.3

1) 设 $t \in \mathbb{R}$, 求解关于 x 的方程

$$x^2 + 4(t-1)x + 3t^2 - 10t + 3 = 0.$$

2) 求解方程

$$2x^2 - (9i + 1)x - 7 + 11i = 0.$$

3) 求 $\tan \frac{\pi}{12}$.

定理 1.2.2 (复系数二次方程根与系数的关系) 设 $a, b, c \in \mathbb{C}$ 且 $a \neq 0$, $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, 则

$$z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}, \quad z_1 z_2 = \frac{c}{a}$$

当且仅当 z_1, z_2 是方程 $az^2 + bz + c = 0$ 的两个根.

例子 1.2.4

1) 求解方程 $z^2 - (1 + a + a^2)z + a(1 + a^2) = 0$.

3) 设 z_1, z_2 是方程 $(7 - 6i)z^2 - 2(7 - 6i)z - 85 = 0$ 的两个根, 不具体求解 z_1 和 z_2 , 直接计算 $z_1^2 + z_2^2 - z_1 z_2$.

§1.2.3 1 的 n 次根

设 $n \in \mathbb{N}^*$.

定义 1.2.2 若 $z \in \mathbb{C}$ 满足 $z^n = 1$, 则称 z 为 1 的 n 次根 (racine $n^{\text{ème}}$), 简称为 n 次单位根.

命题 1.2.2 n 次单位根恰好有 n 个, 它们是

$$\omega_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}} = \omega_1^k, \quad k \in [0, n-1].$$

证明 设 $z \in \mathbb{C}$, $z^n = 1$, 则 $|z^n| = |z|^n = 1$, 从而 $|z| = 1$. 由复数的三角形式可得, 存在 $\theta \in \mathbb{R}$ 使得

$$z = e^{i\theta}.$$

所以

$$e^{in\theta} = 1.$$

有前面的学习得: $n\theta \equiv 0[2\pi]$, 即

$$\theta = \frac{2k\pi}{n}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

由于 $e^{i\frac{2k\pi}{n}} = e^{i\frac{2(k+n)\pi}{n}}$, 故只需取 $k \in [0, n-1]$ 即可得到所有的单位根. 另外, 由 $\omega_1 = e^{i\frac{2\pi}{n}}$ 易得, $\forall k \in [0, n-1]$, $\omega_k = \omega_1^k$. \square

记 $U_n = \{e^{i\frac{2k\pi}{n}} | k \in [0, n-1]\}$, 则

命题 1.2.3 U_n 相对于乘法和除法是封闭的, 即 $\forall z_1, z_2 \in U_n$, 有

$$z_1 z_2 \in U_n, \quad \frac{z_1}{z_2} \in U_n.$$

定理 1.2.3 设 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$.

1) 若 ω 是 n 次单位根且 $\omega \neq 1$, 则

$$1 + \omega + \omega^2 + \cdots + \omega^{n-1} = 0.$$

2) 所有 n 次单位根的和为 0.

证明 1) 利用等比数列前 n 项和. 2) 直接求和. □

例子 1.2.5 求 1 的 3 次根.

证明 由公式可得: $z_0 = 1, z_1 = e^{\frac{2\pi}{3}i}, z_2 = e^{\frac{4\pi}{3}i}$. 特别地, 记 $j = e^{\frac{2\pi}{3}i}$. 则 1 的 3 次根便可记为 $1, j, j^2$. □

§1.2.4 z 的 n 次根

定义 1.2.3 设 $z \in \mathbb{C}$, 若 $Z \in \mathbb{C}$ 满足 $Z^n = z$, 则称 Z 是 z 的 n 次根.

命题 1.2.4 设 $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. 若 u 是 z 的一个 n 次根, 则 z 的 n 次根的集合为

$$\{u\omega \mid \omega \in U_n\}.$$

推论 1.2.2 设 $n \in \mathbb{N}^*, z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 模为 r , 幅角为 θ , 则 z 有 n 个 n 次根, 它们是

$$Z_k = r^{\frac{1}{n}} e^{i(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n})}, \quad k \in [0, n-1].$$

例子 1.2.6 求 i 的 5 次根.

§1.2.5 求解 n 次方程

例子 1.2.7

1) $z^3 - (5 + 3i)z^2 + (7 + 16i)z + 3 - 21i = 0.$

2) $z^6 - (3 + 2i)z^3 + 2 + 2i = 0.$

定理 1.2.4 (降次法求解高次方程) 设 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1, 2\}$, $(a_0, a_1, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$. 考虑 n 次复系数方程

$$(E_n) \quad z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_1z + a_0 = 0.$$

1) 若方程有一个显而易见的根, 不妨记为 α , 则可将方程写为

$$(z - \alpha)(z^{n-1} + b_{n-2}z^{n-2} + \dots + b_1z + b_0) = 0,$$

然后根据系数对应相等求得 $(b_0, b_1, \dots, b_{n-2})$, 从而得到 $n - 1$ 次方程

$$(E_{n-1}) \quad z^{n-1} + b_{n-2}z^{n-2} + \dots + b_1z + b_0 = 0.$$

这样, 方程 (E_{n-1}) 的根和 α 就是方程 (E_n) 的根. 然后对方程 (E_{n-1}) 用上面的方法继续降次到可以求解为止.

2) 也可假设方程有一个实根或者纯虚根, 不妨设为 $z = x$ 或 $z = ix$, $x \in \mathbb{R}$. 然后将其带入, 分离实虚部得到两个方程. 通过这两个方程解出 x , 然后与1)类似.