

Dérivation

1 Déterminer l'ensemble sur lequel les expressions suivantes sont dérivables et calculer leur dérivée.

- | | |
|--|--|
| 1. $\frac{2x+1}{x-2} - \frac{1}{x+4}$;
2. $\frac{x^2+1}{x^2-9}$;
3. $x^2 - 2x + \frac{3}{x}$;
4. $(x^3 - 2x + 1)^3$;
5. $\sqrt{x^3 + x^2 + 5x}$;
6. $\sqrt{\frac{x-1}{x+3}}$;
7. $\sin(3x^2)$;
8. $\text{sh}(2 \operatorname{argsh} x) + 2 \operatorname{argsh} x$; | 9. $\text{sh}^2 \sqrt{x}$;
10. $\operatorname{ch}(x\sqrt{1-2x-x^2})$;
11. $\operatorname{sh}(\ln(x + \sqrt{x^2+1}))$;
12. $\operatorname{ch}(\ln(x + \sqrt{x^2-1}))$;
13. $\arcsin(x + \sqrt{x^2-1})$;
14. $\exp(x^2)$;
15. $\exp(x^{x^2})$;
16. x^x ;
17. $\ln(\operatorname{cose}^x)$;
18. $\sqrt{\sqrt{\exp x}}$. |
|--|--|

2

1. Où la fonction $x \mapsto \frac{1-\cos x}{x}$ est-elle définie? Où est-elle continue? Où est-elle prolongeable par continuité? Où son prolongement est-il dérivable?
2. La fonction $x \mapsto \cos \sqrt{x}$ est-elle de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R} ?

3 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer les dérivées n -èmes des fonctions suivantes :

- | | |
|---|--|
| 1. $x \mapsto x^p \cos px \quad p \in \mathbb{N}$ | 5. $x \mapsto \frac{1-x}{1+x}$ |
| 2. $x \mapsto x^{n-1} \ln(1+x)$ | 6. $x \mapsto x^{n-1} e^{1/x}$ |
| 3. $x \mapsto (x^2+x)e^x$ | 7. $x \mapsto \ln(1-2x \cos \alpha + x^2)$ |
| 4. $x \mapsto \frac{x^2+1}{(x+1)^3}$ | 8. $x \mapsto e^{x \cos \alpha} \cos(x \sin \alpha)$ |

4 Soit f l'application de \mathbb{R} dans lui-même, définie par

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ e^{-1/x^2} & \text{si } x \neq 0 \end{cases}$$

Montrer que f est infiniment dérivable sur \mathbb{R} .

5 Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et f une application n fois dérivable sur \mathbb{R}^* . On pose

$$\forall x \in \mathbb{R}^* \quad g(x) = x^{n-1} f\left(\frac{1}{x}\right)$$

Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}^* \quad g^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n}{x^{n+1}} f^{(n)}\left(\frac{1}{x}\right)$

6 Soit P un polynôme de degré $n \geq 2$ à coefficients réels, scindé sur \mathbb{R} . Montrer que P' est scindé sur \mathbb{R} .

7 Soit n un entier. On note f la dérivée n -ème de la fonction $x \mapsto (x^2 - 1)^n$. Montrer que f s'annule exactement n fois dans $] -1; 1[$. Calculer $f(1)$ et $f(-1)$.

8 Soit f dérivable sur \mathbb{R} . On suppose que f a une limite (finie ou infinie) en $+\infty$ et $-\infty$, et que ces limites sont égales. Montrer qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $f'(c) = 0$.

9 On pose $\forall k \in \mathbb{N} \quad P_k = \sum_{n=0}^k (-1)^n \frac{X^{2n+1}}{(2n+1)!}$

1. Prouver que $\forall x \in \mathbb{R} \quad |\sin x - P_0(x)| \leq \frac{|x|^3}{6}$
2. Prouver que $\forall x \in [0; \frac{\pi}{2}] \quad 0 \leq \sin x - P_3(x) \leq \frac{x^9}{9!}$
3. Trouver un $\alpha > 0$ tel que $\forall x \in [0; \alpha] \quad |\sin x - P_3(x)| \leq 10^{-10}$
4. Trouver un entier k tel que $\forall x \in [0; 1] \quad |\sin x - P_k(x)| \leq 10^{-20}$

10 Montrer que pour chaque $t > 0$, assez petit, il existe un unique $c(t) \in]0; 1[$ tel que

$$\sin t = t - \frac{t^3}{6} \cos(tc(t))$$

Étudier l'existence d'une limite pour c en 0.

11 Soient f et g continues sur $[a; b]$, dérivables sur $]a; b[$. On suppose que g' ne s'annule pas au voisinage de a et que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existe et vaut $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Montrer que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}$ existe et vaut ℓ . Proposer une généralisation au cas où l'intervalle est de la forme $[b; +\infty[$.

12 Soient f et g dérivables sur $]a; b[$, ayant une limite infinie en a et telles que g' ne s'annule pas au voisinage de a . On suppose que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existe et vaut $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Montrer que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ existe et vaut ℓ . Proposer une généralisation au cas où l'intervalle est de la forme $[b; +\infty[$.

13 Soit f dérivable sur $[a; b]$, telle que $f'(a) \leq f'(b)$. Montrer que si $\gamma \in [f'(a); f'(b)]$, il existe $c \in [a; b]$ tel que $f'(c) = \gamma$.

Indication : On pourra considérer les fonctions $x \mapsto \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ et $x \mapsto \frac{f(x)-f(b)}{x-b}$.

14 Trouver une équation différentielle d'ordre 2 satisfaite par la fonction arcsin. En déduire $\arcsin^{(n)}(0)$ pour tout entier n .

15 Soient $f \in \mathcal{C}^2([a; b])$ et $x \in]a; b[$. Montrer qu'il existe $c \in]a; b[$, tel que

$$f(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) + \frac{(x - a)(x - b)}{2} f''(c)$$

Indication : On pourra considérer $t \mapsto f(t) - f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} (t - a) - \frac{(t - a)(t - b)}{2} A$, où A est un réel astucieusement choisi.

16 Soit f une fonction n fois dérivable sur un intervalle I . On suppose que f s'annule en $x_1 < \dots < x_n$. Soit $a \in]x_1; x_n[$. Montrer qu'il existe $c \in]x_1; x_n[$, tel que

$$f(a) = \frac{f^{(n)}(c)}{n!} \prod_{k=1}^n (a - x_k)$$

17 Soit f deux fois dérivable sur \mathbb{R} , telle que f et f'' sont bornées. On note

$$M_0 = \sup_{\mathbb{R}} |f| \quad M_2 = \sup_{\mathbb{R}} |f''|$$

Montrer que f' est bornée sur \mathbb{R} et que

$$\sup_{\mathbb{R}} |f'| \leq \sqrt{2M_0M_2}$$

Indication : Si $x \in \mathbb{R}$ et $h > 0$, utiliser le théorème de Taylor en $x + h$ et en $x - h$.

Démontrer un résultat similaire dans le cas où f est trois fois dérivable, avec f et $f^{(3)}$ bornées.

18 Soient $n \in \mathbb{N}$ et f de classe \mathcal{C}^{n+1} sur \mathbb{R} telle que $f(0) = 0$. On définit

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} \frac{f(x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ ?? & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Quelle valeur faut-il donner à $g(0)$ pour que g soit continue? Montrer alors que g est \mathcal{C}^n sur \mathbb{R} .