

Espaces de Dimension Finie

Lorsque rien n'est précisé, le contexte de l'exercice est un espace vectoriel E sur un corps commutatif \mathbb{K} .

1 Pour chacun des systèmes de vecteurs suivants, décider s'ils sont linéairement indépendants ou pas dans \mathbb{R}^n ou \mathbb{C}^n . Donner une base du sous-espace qu'ils engendrent et trouver un supplémentaire de ce sous-espace. Enfin, donner leur rang, une fois que cette notion aura été étudiée en cours.

$$\begin{cases} x_1 = (-3, 1, 5) \\ x_2 = (6, 12, 15) \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = (4, -12, 28) \\ x_2 = (-7, 21, -49) \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = (1, 2, 3, 0) \\ x_2 = (2, 4, 6, 1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = (1, i, 2 - i, 3 + i) \\ x_2 = (1 - i, 1 + i, 3 - i, 4 - 2i) \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = (1, 2, 3) \\ x_2 = (2, 5, 7) \\ x_3 = (3, 7, 10) \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = (1, 2, 3) \\ x_2 = (2, 5, 7) \\ x_3 = (3, 7, 11) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = (1, 2, 3) \\ x_2 = (2, 5, 7) \\ x_3 = (3, 7, \alpha) \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = (1, 1, 1, 1) \\ x_2 = (1, -1, -1, 1) \\ x_3 = (1, -1, 1, -1) \\ x_4 = (1, 1, -1, -1) \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = (5, -3, 2, 1, 10) \\ x_2 = (-1, 8, 1, -4, 7) \\ x_3 = (2, 1, 9, -3, 6) \\ x_4 = (1, 3, -5, 9, 11) \end{cases}$$

2 Soient x, y et z trois vecteurs linéairement indépendants. Examiner l'indépendance linéaire de chacune des familles de vecteurs suivantes :

$$(x, x + y, x + y + z) \quad (x + y, y + z, z + x) \quad (x - y, y - z, z - x)$$

Plus généralement, si u_1, \dots, u_n sont des vecteurs linéairement indépendants, discuter l'indépendance linéaire de la famille (v_1, \dots, v_n) lorsque :

(a) $v_1 = u_1 - u_2 \quad v_2 = u_2 - u_3 \quad \dots \quad v_{n-1} = u_{n-1} - u_n \quad v_n = u_n - u_1$

(b) $v_1 = u_1 + u_2 \quad v_2 = u_2 + u_3 \quad \dots \quad v_{n-1} = u_{n-1} + u_n \quad v_n = u_n + u_1$

3 Montrer que, quels que soient les vecteurs x, y, z et les scalaires α, β, γ , les trois vecteurs $\alpha x - \beta y, \gamma y - \alpha z, \beta z - \gamma x$ sont liés.

4 Soient a, b, c trois nombres réels distincts. Examiner si les trois polynômes

$$(X - a)(X - b), (X - b)(X - c), (X - c)(X - a)$$

forment une famille libre dans $\mathbb{K}[X]$.

5 Soit $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de vecteurs d'un \mathbb{K} -espace vectoriel E. On appelle *opération élémentaire sur les $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$* une des opérations suivantes :

- échanger deux vecteurs de cette famille ;
- multiplier un vecteur de cette famille par un scalaire non nul ;
- ajouter à un vecteur de cette famille une combinaison linéaire des autres.

Montrer que le rang de la famille $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ n'est pas modifié après une opération élémentaire.

6 Soit E l'espace vectoriel des fonctions réelles à valeurs réelles. Soit n un entier non nul, soient r_1, \dots, r_n des nombres complexes distincts. Montrer que les fonctions $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ définies par

$$\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket \quad e_i : x \mapsto e^{r_i x}$$

forment une famille libre. En déduire que E n'est pas de dimension finie.

7 Posons $V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x = y - 2z \quad z = 2t\}$

Trouver une base et un supplémentaire de V, sans oublier d'expliquer pourquoi V est un sous-espace de \mathbb{R}^4 .

8 Trouver une base du noyau et de l'image des applications linéaires suivantes :

$$f_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad f_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y, z) \mapsto (2x + y + z, y + z, x) \quad (x, y, z) \mapsto (x + y - z, 2x - y + z)$$

$$f_3 : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_4[X]$$

$$P \mapsto X(P' - P'(0))$$

9 Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et f l'application définie par

$$\forall P \in \mathbb{K}_n[X] \quad f(P) = P(X + 1) + P$$

Montrer que P est linéaire, trouver $\text{Ker } f, \text{Im } f, \text{Ker}(f - 2\text{id})$ et $\text{Im}(f - 2\text{id})$.

10 Soient E un \mathbb{K} -espace vectoriel de dimension finie n et $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. Montrer que $\text{Ker } u = \text{Ker } u^2 \iff \text{Im } u = \text{Im } u^2 \iff \text{Ker } u + \text{Im } u = E$

Donner un exemple d'un tel u .

2. Montrer que

$$\text{Ker } f = \text{Im } f \iff (f^2 = 0 \quad \text{et} \quad n = 2\text{rg } f)$$

3. Soit $v \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que $\text{Ker } u + \text{Ker } v = \text{Im } u + \text{Im } v = E$. Montrer que ces deux sommes sont directes.

11 Soit $n \in \mathbb{N}$. On note $E = \mathbb{C}_n[X]$ et

$$\forall k \in \llbracket 0; n \rrbracket \quad P_k = X^k(1 - X)^{n-k}$$

Montrer que (P_0, \dots, P_n) est une base de E .

12 Soit E un \mathbb{K} -espace vectoriel de dimension finie. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . À quelle condition (nécessaire et suffisante) existe-t-il un endomorphisme f de E tel que $\text{Ker } f = F$ et $\text{Im } f = G$?

13 Soient E, F et G trois \mathbb{K} -espaces vectoriels de dimensions finies.

1. Soient u et v dans $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{L}(F, G)$. Montrer que

$$\dim \text{Ker } vu \leq \dim \text{Ker } u + \dim \text{Ker } v$$

et que $\text{rg } u + \text{rg } v - \dim F \leq \text{rg}(vu) \leq \min(\text{rg } u, \text{rg } v)$

2. Soient $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$. Montrer que

$$|\text{rg } u - \text{rg } v| \leq \text{rg}(u + v) \leq \text{rg } u + \text{rg } v$$

14 Soient E un \mathbb{K} -espace vectoriel de dimension finie n et $f \in \mathcal{L}(E)$. On pose

$$\forall p \in \mathbb{N} \quad K_p = \text{Ker } f^p \quad \text{et} \quad I_p = \text{Im } f^p$$

1. Montrer que $K_p \subset K_{p+1}$ et $I_{p+1} \subset I_p$ pour tout entier p .
2. En déduire qu'il existe $p \in \llbracket 0; n \rrbracket$ tel que $K_p = K_{p+1}$ et $I_p = I_{p+1}$.
3. On note p_0 le plus petit entier p qui vérifie la propriété ci-dessus. Montrer que

$$\forall p \geq p_0 \quad K_p = K_{p_0} \quad \text{et} \quad I_p = I_{p_0}$$

4. Montrer que la suite $(\dim(K_{p+1}) - \dim(K_p))_{p \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
5. On suppose que f est nilpotent, c'est-à-dire qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $f^k = 0$. Montrer que $f^n = 0$.

15 Soient E de dimension finie $n \neq 0$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent. On appelle *indice de nilpotence de f* le plus petit entier k tel que $f^k = 0$.

Montrer que si f est nilpotent d'indice n , il existe $x \in E$ tel que $(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))$ est une base de E . Calculer le rang de f et montrer que $I + f$ est un automorphisme de E .

16 Soit E un \mathbb{K} -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $p \in \mathbb{N}^*$ et f_1, \dots, f_p des formes linéaires sur E . Montrer que, si $f \in E^*$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$(i) : f \in \text{Vect}(f_1, \dots, f_p) \qquad (ii) : \text{Ker } f \supset \bigcap_{k=1}^p \text{Ker } f_k$$

17 Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel de dimension finie et soit f un endomorphisme de E tel que $f^3 = I$.

1. Montrer que $\text{Im}(I - f) \subset \text{Ker}(I + f + f^2)$.
2. Montrer que $E = \text{Ker}(I - f) \oplus \text{Im}(I - f)$.
3. On note $F = \text{Im}(I - f)$. Soit $x \in F$, non nul; montrer que $f(x) \neq 0$ et que $(x, f(x))$ est libre.
4. Montrer que F est de dimension paire.

18 Soit E un \mathbb{K} -espace vectoriel de dimension finie. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Montrer que F et G admettent un supplémentaire commun si et seulement si $\dim F = \dim G$.

19 On suppose E de dimension finie n non nulle. On note \mathcal{V} l'ensemble de tous les sous-espaces de E . Soit φ une application de \mathcal{V} dans \mathbb{N} telle que

$$\begin{cases} \varphi(\{0\}) = 0 \\ \varphi(E) = n \\ \forall E_1, E_2 \in \mathcal{V} \quad \varphi(E_1 + E_2) = \varphi(E_1) + \varphi(E_2) - \varphi(E_1 \cap E_2) \end{cases}$$

1. Soient $p \in \mathbb{N}^*$ et E_1, \dots, E_p des sous-espaces de E , en somme directe. Montrer que

$$\varphi\left(\bigoplus_{k=1}^p E_k\right) = \sum_{k=1}^p \varphi(E_k)$$

2. Soit F un sous-espace de E , de dimension $n - 1$, tel que $\varphi(F) \geq n$. Montrer qu'il existe G_1, \dots, G_n sous-espaces de E , tous supplémentaires de F , tels que

$$E = \bigoplus_{k=1}^n G_k \quad \text{et} \quad (\forall k \in \llbracket 1; n \rrbracket) \quad \varphi(G_k) = 0$$

3. En déduire que si G est un sous-espace de E , de dimension 1, alors $\varphi(G) = 1$.
4. Conclure : que peut-on dire sur φ ?

Indications

Voici quelques indications pour les exercices plus difficiles.

- 14.4 : Prendre un supplémentaire F de K_{p+1} dans K_{p+2} et étudier la restriction de f à F .
- 16 : Pour montrer (ii) \implies (i) : Supposer d'abord que (f_1, \dots, f_p) est libre. Considérer l'application

$$\begin{aligned} \Phi : E &\longrightarrow \mathbb{K}^{p+1} \\ x &\longmapsto (f_1(x), \dots, f_p(x), f(x)) \end{aligned}$$

et prouver qu'elle n'est pas surjective. Alors il existe un hyperplan qui contient $\text{Im } \Phi$.

- 18 : Faire un dessin. Procéder par récurrence descendante sur la dimension commune de F et G .