

## Espaces Vectoriels

La lettre  $\mathbb{K}$  désigne toujours un corps commutatif. Pour les exercices **12** et **13**, on suppose que  $2 \neq 0$  dans  $\mathbb{K}$ .

**1** Déterminez si chacun des ensembles suivant est un espace vectoriel, sur  $\mathbb{R}$  ou sur  $\mathbb{C}$  :

1. Les vecteurs de  $\mathbb{R}^2$  dont les coordonnées sont distinctes.
2. Les vecteurs de  $\mathbb{R}^n$  dont la première et la deuxième coordonnée sont égales ;
3.  $\{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 \mid z_1^2 = z_2\}$  ;
4. L'ensemble des fonctions à valeurs complexes, dérivables sur  $[0; 1]$ , valant 0 en 0 et dont la dérivée en 1/2 vaut 0 ;
5. L'ensemble des fonctions à valeurs réelles dérivables sur  $[0; 1]$ , dont la dérivée en 1/2 vaut 1 ;
6. L'ensemble des fonctions polynomiales de degré inférieur à 3, dont les dérivées première et seconde sont nulles en 0 ;
7. L'ensemble des fonctions continues sur  $[-1; 1]$  d'intégrale nulle sur cet intervalle ;
8. L'ensemble des fonctions monotones sur  $\mathbb{R}$ .

**2** Soit  $E$  un espace vectoriel. Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ . Montrer que  $F \cup G$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  si et seulement si  $F \subset G$  ou  $G \subset F$ .

**3** Donner une partie génératrice de  $\mathbb{C}^3$ , la plus simple possible, en tant que  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel, puis en tant que  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

**4** Soit  $A$  la partie de  $\mathbb{R}^4$  définie par

$$A = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid 2x_1 + 3x_2 = 0 \text{ et } x_3 = x_4^2 + 1\}$$

Soit  $B$  la partie de  $\mathbb{R}^4$  constituée des vecteurs  $(-3, 2, 0, 0)$ ,  $(0, 0, 1, 0)$  et  $(0, 0, 0, 1)$ . On pose

$$F = \text{Vect}A \quad \text{et} \quad G = \text{Vect}B$$

Montrer que  $F \subset G$ .

**5** Soient  $E, F$  et  $G$  trois espaces vectoriels. Soient  $f \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $g \in \mathcal{L}(F, G)$ . Montrer que

1.  $\text{Ker}(g \circ f) = f^{-1}(\text{Ker } g)$  ;
2.  $\text{Ker } f \subset \text{Ker}(g \circ f)$  ;
3.  $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im } g$ .

**6** Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, soient  $f$  et  $g$  deux endomorphismes de  $E$ . Montrer que s'ils commutent, le noyau et l'image de  $f$  sont stables par  $g$ .

**7** Soient  $f$  et  $g$  deux formes linéaires sur un espace vectoriel  $E$ , telles que

$$\forall x \in E \quad f(x)g(x) = 0$$

Montrer que  $f = 0$  ou  $g = 0$ .

**8** Soit  $u$  un vecteur de  $\mathbb{R}^3$  et soit  $f$  l'application définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}^3 \quad f(x) = x \wedge u$$

Montrer que  $f$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$ . Est-ce une injection ? Une surjection ? Trouver une relation entre  $f$  et  $f^3$ .

**9** Soit  $E$  un espace vectoriel. Soit  $f$  un endomorphisme de  $E$ . Montrer que les noyaux de  $f$  et  $f^2$  sont égaux si et seulement si  $\text{Im } f$  et  $\text{Ker } f$  sont en somme directe. Puis montrer que  $\text{Im } f = \text{Im } f^2$  si et seulement si  $E = \text{Ker } f + \text{Im } f$ .

**10** Soit  $E$  l'espace vectoriel des fonctions de  $\mathbb{R}$  dans lui-même, continues en 0. Soit  $\Phi$  l'application de  $E$  dans lui-même qui à tout  $f$  de  $E$  associe la fonction  $\Phi(f)$  définie par

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \Phi(f)(x) = f(x) + f(2x)$$

Montrer que  $\Phi$  est injective.

**11** Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit  $W$  un sous-espace de  $E$  ; on considère :

$$\mathcal{A} = \{u \in \mathcal{L}(E, F) \mid W \subset \text{Ker } u\}$$

Montrer que  $\mathcal{A}$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{L}(E, F)$ .

**12** Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, soit  $E_0$  un sous-espace strict.  $f$  est un endomorphisme de  $E$  tel que

$$\forall x \in E \setminus E_0 \quad \exists \lambda \in \mathbb{K} \quad f(x) = \lambda x$$

Montrer que  $f$  est une homothétie.

*Indication : Montrer que le  $\lambda$  associé à chaque  $x$  est unique, ce qui définit une application  $x \mapsto \lambda(x)$  sur  $E \setminus E_0$ . Montrer que  $\lambda(x) = \lambda(y)$  si  $x$  et  $y$  sont dans  $E \setminus E_0$ , d'abord dans le cas où ils sont proportionnels, puis dans le cas où ils ne le sont pas. Conclure.*

**13** Soit  $f$  un endomorphisme de  $E$  qui commute avec tout automorphisme de  $E$ .

1. Soient  $g \in \mathcal{GL}(E)$  et  $x \in E \setminus \{0\}$ , tels que  $g(x) = x$ . Montrer que  $g \circ f(x) = f(x)$ .
2. Soit  $x \in E \setminus \{0\}$ . Montrer qu'il existe  $g \in \mathcal{GL}(E)$ , tel que

$$\forall y \in E \quad g(y) = y \iff y \in \text{Vect } x$$

*Indication : On peut penser à une symétrie et utiliser le fait que tout sous-espace admet des supplémentaires.*

3. En déduire que  $f$  vérifie la propriété de l'exercice 12. Conclure.

**14** On définit

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \quad f(x, y, z) = (-x\sqrt{2} + z, y\sqrt{2} + z, x + y)$$

1. Vérifier que  $f$  est linéaire.
2. Déterminer  $\text{Ker } f$ .
3. Déterminer  $\text{Ker}(f - 2I)$  et  $\text{Ker}(f + 2I)$ .
4. Montrer que  $\text{Im } f = \text{Ker}(f - 2I) \oplus \text{Ker}(f + 2I)$  et  $E = \text{Im } f \oplus \text{Ker } f$ .
5.  $f$  est-il un projecteur ?

**15** Dans l'espace vectoriel  $E = \mathcal{C}(\mathbb{R})$  (fonctions continues sur  $\mathbb{R}$ ), on considère

$$F = \left\{ f \in E \mid \int_0^1 f(t) dt = 0 \right\}$$

Montrer que  $F$  est un sous-espace vectoriel ; plus précisément, qu'il s'agit d'un hyperplan. En trouver un supplémentaire.

**16** Identifier les applications linéaires suivantes (symétrie ? projection ?) :

1.  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad f(x, y) = (y, x) \quad \text{et} \quad g(x, y) = (-y, -x)$
2.  $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \quad f(x, y, z) = (z, -x + y + z, z)$
3.  $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \quad f(x, y, z) = (-x + 2z, -2x + y + 2z, z)$

**17** On se place dans le  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel  $\mathbb{R}^3$  et on considère les sous-espaces suivants :

$$F = \text{Vect}((2, 1, 0); (1, 0, 2)) \quad \text{et} \quad G = \text{Vect}((2, 2, -5))$$

Après avoir montré que  $F$  et  $G$  sont supplémentaires dans  $\mathbb{R}^3$ , donner l'expression analytique des projections sur  $F$  parallèlement à  $G$ , sur  $G$  parallèlement à  $F$  et de la symétrie par rapport à  $G$  parallèlement à  $F$ .

**18** Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient  $f$  et  $g$  deux endomorphismes de  $E$ . On pose  $q = f + g - gf$ .

1. Montrer que  $\text{Im } g \subset \text{Ker } f$  si et seulement si  $fg = 0$ .
2. On suppose que  $f$  et  $g$  sont des projecteurs, tels que  $\text{Im } g \subset \text{Ker } f$ . Montrer que
  - $q$  est un projecteur ;
  - $\text{Im } q = \text{Im } f + \text{Im } g$  ;
  - $\text{Ker } q = \text{Ker } f \cap \text{Ker } g$ .

**19** Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel,  $f$  un endomorphisme de  $E$  et  $p$  un projecteur. Montrer que  $fp = pf$  si, et seulement si,  $\text{Ker } p$  et  $\text{Im } p$  sont stables par  $f$ .